

模式标本采自四川松潘。

11. 峨眉点地梅(植物分类学报) 图版 39: 2

Androsace paxiana R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22**(IV-237): 176. 1905; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 270. 1927. — *Androsace henryi* var. *omeiensis* R. Knuth l.c. 176. 1905.

多年生草本。根状茎短，单一或偶有分枝，具少数粗根及纤维状须根。叶丛生根茎端，叶片圆形，稀肾圆形，直径1.5—4厘米，基部浅心形，边缘具波状圆齿，近革质，上面被贴伏的短硬毛，下面毛较长且密，老时脱落，两面均近于无毛，叶脉不明显；叶柄稍坚硬，圆柱状，与叶片等长或长于叶片1.5—3倍，被开展的疏柔毛。花葶通常2—4枚自叶丛中抽出，直立，较叶柄纤细，除基部外，被向上的伏毛；伞形花序8—14花；苞片线形，长3—4毫米；花梗纤细，长6—15毫米，被小伏毛；花萼狭钟状，长2.5—4毫米，分裂近达中部，裂片卵状三角形，先端稍钝，外面被伏毛，边缘具缘毛，果期变无毛，具明显的3—5纵脉；花冠白色，直径6—7.5毫米，裂片倒卵状长圆形，先端微凹或浅心形。蒴果倒卵形，短于宿存花萼。花期4—5月；果期6月。

产于四川峨眉山和灌县。生于山坡林缘，海拔1000—1400米。模式标本采自峨眉山。

12. 细弱点地梅(植物分类学报)

Androsace gracilis Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien. Math.-Nat. **61**: 135. 1924, et in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 271. 1927; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 219. 1986.

多年生草本。全株被短小刚毛，但在花葶和花梗上毛密而开展，其余部分较稀疏。叶心状卵形，长2—3.8厘米，先端圆形，基部心形弯缺狭而深，边缘具小圆齿至浅裂状圆齿，密被缘毛，干时膜质，越年生叶则稍坚硬，深绿色，基出脉3—5条，支脉少数，斜伸，在背面稍明显；叶柄细，与叶片等长或长达叶片的2.5倍。花葶多数，直立，极细弱，高7.5—16厘米；伞形花序5—20花；苞片线状披针形，草质，长2.5—4毫米；花梗近等长，长10—23毫米；花萼漏斗状，长3毫米，分裂近达全长的2/3，裂片狭卵形，先端钝，果期伸长成线状长圆形，长达5毫米，两面有纵脉多条；花冠白色或粉红色，筒部阔，短于花萼，喉部具环形隆起，冠檐直径6毫米，裂片倒心形，小裂片狭而开张；花药小，与花丝等长，稍露出冠筒；花柱长达花冠喉部。蒴果与花萼等长。

产于云南中部和东北部。生于湿润多石的低地。模式标本采自云南中部。

标本未见，上述记载是根据原始文献翻译而成。

13. 贵州点地梅(植物分类学报)

Androsace kouytchensis Bonati in Bull. Soc. Bot. Geneve 2, ser. 5: 277. 1913; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 271. 1927; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 219. 1986.

多年生草本,无匍匐茎。叶基生,近圆形,直径1—2.5厘米,先端钝圆,基部心形弯缺深达叶片的1/5—1/4,边缘具不平整的浅裂状圆齿,两面被铁锈色多细胞柔毛,近边缘较密,成缘毛状;叶柄长1.5—2.5厘米,被开展的硬毛。花葶通常2—5自叶丛中抽出,初时上升或直立,高4—7厘米,稍高出叶丛,后披散或匍伏,伞形花序6—10花;苞片线形,长约2毫米;花梗纤细、曲折,长15—20毫米,果时反折,与花葶同被开展的长毛和无柄腺体;花萼长约3毫米,密被多细胞柔毛,分裂达全长的1/3,裂片卵形,先端锐尖,果时不展开;花冠白色,筒部长约2毫米,比花萼短,裂片长圆形,长2毫米,宽约1.5毫米,先端截形。子房被毛。

产于贵州中部。模式标本采自龙里附近。

14. 折梗点地梅(植物分类学报)

Androsace refracta Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 162. 1931.
C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 219. 1986.

多年生草本。根状茎短小,具少数褐色支根。叶多数,基生,叶片圆形,直径6—15毫米,基部深心形,凹缺窄,深达叶片的2/7,边缘具不规则的粗圆齿,干时膜质,淡绿色,两面疏被稍卷曲的多细胞柔毛及无柄小腺体,边缘具缘毛;叶柄纤细,通常比叶片长2—2.5倍,密被开展的白色多细胞柔毛。花葶多数,约与叶丛等高,连同花梗、苞片及花萼均被多细胞硬毛及无柄腺体;伞形花序有花4—15朵;苞片多数,线形,长2—4毫米;果梗长7—12毫米,位于花序外缘的自基部向外反折;花萼杯状,长3—4毫米,分裂达中部以下,裂片三角状披针形,具3纵脉和增厚的尖头。蒴果球形,淡褐色,稍超出萼筒。

产于贵州中部。模式标本采自龙里。

据原始文献记载,此种的模式标本与采自贵州龙里的异叶点地梅 *A. runcinata* Hand.-Mazz. 在同一纸夹内,两张标本只有一份标签,因此产地不一定可靠。Handel-Mazzetti 已注意到此种的生长习性与贵州点地梅 *A. kouytchensis* Bonati 相近,但对二者的区别未详细指明。我们未采到标本,在巴黎自然博物馆亦未找到此种的模式标本,以上描述系根据原始记载翻译而成。根据描述,它与贵州点地梅的区别似乎主要在于毛被的颜色、花梗的长度和花萼分裂的深度等方面。但此种的模式是一份果标本,而本属有些种类毛被的颜色老时可能变淡,花梗、花萼果时亦可能伸长和增大,因此二者有可能是同一种植物。

15. 点地梅(拉汉种子植物名称) 喉咙草(江苏、浙江), 佛顶珠、白花草、清明花(贵州), 天星花(云南) 图版 40: 4

Androsace umbellata (Lour.) Merr. in Philip. Journ. Sci. **15**: 237. 1919; 海南植物志 **3**: 437. 1974; 中国高等植物图鉴 **3**: 268. 图 4489. 1974; 东北草本植物志 **7**: 25. 图版 11. 1981. — *Drosera umbellata* Lour. Fl. Cochinch. 186. 1790. — *Androsace saxifragaefolia* Bunge in Mem. Acad. St. Petersburg. **2**: 127. 1833. — *Primula minuii*-