

flora G. Forr. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **4**: 219. 1908. — *Primula umbellata* (Lour.) Benth. in Fl. Malesiana 1, ser. 1. **6**: 191. 1962.

一年生或二年生草本。主根不明显，具多数须根。叶全部基生，叶片近圆形或卵圆形，直径 5—20 毫米，先端钝圆，基部浅心形至近圆形，边缘具三角状钝牙齿，两面均被贴伏的短柔毛；叶柄长 1—4 厘米，被开展的柔毛。花葶通常数枚自叶丛中抽出，高 4—15 厘米，被白色短柔毛。伞形花序 4—15 花；苞片卵形至披针形，长 3.5—4 毫米；花梗纤细，长 1—3 厘米，果时伸长可达 6 厘米，被柔毛并杂生短柄腺体；花萼杯状，长 3—4 毫米，密被短柔毛，分裂近达基部，裂片菱状卵圆形，具 3—6 纵脉，果期增大，呈星状展开；花冠白色，直径 4—6 毫米，筒部长约 2 毫米，短于花萼，喉部黄色，裂片倒卵状长圆形，长 2.5—3 毫米，宽 1.5—2 毫米。蒴果近球形，直径 2.5—3 毫米，果皮白色，近膜质。花期 2—4 月；果期 5—6 月。

产于东北、华北和秦岭以南各省区。生于林缘、草地和疏林下。朝鲜、日本、菲律宾、越南、缅甸、印度均有分布。模式标本采自越南。

民间用全草治扁桃腺炎、咽喉炎、口腔炎和跌打损伤。

16. 花叶点地梅 (植物分类学报) 图版 41: 1—2

Androsace alchemilloides Franch. in Journ. Bot. Morot **9**: 455. 1895; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22**(IV-237): 180. 1905; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 276. 1927; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 219. 1986.

多年生草本。根出短枝簇生，长 1.5—4 厘米，具鳞覆的枯叶柄残片，基部有少数索状粗根。莲座状叶丛生于根茎端；叶片轮廓扇形，长 3—5 毫米，基部短渐狭，掌状 3 裂深达基部，裂片再作 3—4 深裂，小裂片线形，宽 (0.5) 1—1.5 毫米，先端稍钝，两面密被短硬毛；叶柄长约 6 毫米，下半部扩展成鞘状，具膜质边缘。花葶自叶丛中抽出，高 1.5—3 厘米，稍俯垂，密被短硬毛；伞形花序 3—8 (12) 花；苞片椭圆形至长圆状披针形，长 3—5 毫米，腹面无毛，背面密被硬毛；花梗长 5—7 毫米，毛被同花葶；花萼钟状，长 3—4 毫米，密被短硬毛，分裂达中部，裂片卵形，顶端稍钝；花冠白色或粉红色，直径 5—7 毫米，裂片长圆形或长圆状倒卵形，宽约 2 毫米，先端截形或微凹。蒴果近球形，比宿存花萼短。花期 5—6 月。

产于云南西北部。生于山坡草地和阳处石上，海拔 3000—4000 米。模式标本采自云南丽江。

17. 岩居点地梅 (植物分类学报) 图版 41: 3—4

Androsace wilsoniana Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 275. 1927; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 219. 1986.

多年生小草本。根出短枝簇生，长 3—9 毫米，被鳞覆的枯叶柄。莲座状叶丛着生于根茎分枝端，密聚成垫状；叶片轮廓肾形，长 3—5 毫米，宽 5—7 毫米，基部浅心形，掌状



1—2.花叶点地梅 *Androsace alchemilloides* Franch.: 1.植株, 2.叶放大。3—4.岩居点地梅 *Androsace wilsoniana* Hand.-Mazz.: 3.植株, 4.叶片放大。(邓盈丰绘)