

Androsace engleri R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22**(IV-237): 213. 1905; 秦岭植物志4: 41. 1983. p. p.; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 220. 1986.

一年生草本。主根细长,淡褐色,具少数支根。莲座状叶丛单生,叶片披针形或长圆状披针形,长5—15毫米,宽1—3毫米,先端稍锐尖,边缘具牙齿。花萼通常多数,高3—5厘米,被短柔毛或杂有分叉毛。伞形花序多花;苞片阔卵形或长圆状卵形,长3—5毫米,先端钝,初被分叉的短柔毛,渐变无毛;花梗长于苞片1.5—3倍,密被贴伏的短柔毛;花萼钟状,分裂达中部或中部以下,裂片三角形,先端锐尖,果期稍增大;花冠白色或淡红色,直径约3毫米,筒部约与花萼等长,裂片狭卵形,稍长于萼齿,先端圆钝。蒴果球形,短于宿存花萼。

产于陕西南部。模式标本采自户县。未见标本。以上描述系根据原始文献翻译。

组4. 高山组——Sect. Chamaejasme Koch. Synops. Fl. Germ. 584. 1837; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22**(IV-237): 180. 1905. p. p. maiore; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 277. 1927.

多年生,具根出条或根出短枝。莲座状叶丛生于根出条端或根出短枝端,形成疏丛、密丛或半球形的垫状体;叶1—3型,外层叶与内层叶的质地、毛被常不同,形状各种(极少近圆形),全缘,基部常渐狭,无柄或仅内层叶具柄。花组成伞形花序生于花萼端,稀单生。


本组有下列44种。

25. 亚东点地梅(植物分类学报) 异叶点地梅(西藏植物名录) 图版44: 1—5

Androsace hookeriana Klatt in Linnaea **32**: 293. t. 3. 1863; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 499. 1882; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22**(IV-237): 187. 1905, p. p.; S. Gould in Hara et Williams, Fl. Pl. Nepal **3**: 63. 1982; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 221. 1986.

多年生草本,植株由着生于根出条上的莲座状叶丛形成疏丛。根出条节间长2—3厘米,幼时枣红色,疏被短柔毛,老时深紫褐色,近于无毛。叶3型,外层叶披针形,长2.5—4毫米,先端渐尖,干膜质,无毛;中层叶匙形至舌形,长3—6毫米,宽1—1.8毫米,先端钝,薄革质,黄绿色或褐色,腹面无毛,背面近先端具少数柔毛,边缘具缘毛;内层叶少数,卵状椭圆形至倒卵圆形,长5—8毫米,宽4—8毫米,先端钝或浑圆,基部骤然收缩变狭,两面疏被柔毛;叶柄纤细,通常稍短于叶片;生长于新根出条端的叶4—5枚,通常近圆形,具较长的柄。花萼直立,高4—8厘米,疏被柔毛;伞形花序4—8花;苞片线形,长3—5毫米,疏被毛;花梗长6—10毫米,疏被短柔毛;花萼杯状,长2.5—3毫米,疏被柔毛,分裂近达中部,裂片卵形,先端钝,密被缘毛;花冠粉红色,直径达6毫米,裂片阔倒卵形,全缘。花期7月。

产于西藏南部(亚东、帕里)。生于林缘岩石上。分布于不丹、尼泊尔。



1—5. 亚东点地梅 *Androsace hookeriana* Klatt: 1. 植株一部分, 2. 外层叶, 3. 中层叶, 4. 内层叶, 5. 花萼展开。6—10. 绢毛点地梅 *Androsace nortonii* Ludlow: 6. 植株一部分, 7. 外层叶, 8. 中层叶, 9. 内层叶, 10. 花萼展开。(余汉平绘)