

## 26. 卵叶点地梅(卵叶点地梅)

**Androsace ovalifolia** Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. 24: 221.1986.

多年生草本, 植株由细长的根出条和莲座状叶丛形成疏丛。根出条栗褐色, 长2—4厘米, 直径约1毫米, 被褐色柔毛。当年生莲座状叶丛位于根出条顶端; 叶3型, 外层叶卵状披针形, 长4—5毫米, 膜质, 栗褐色, 先端突缩渐尖, 全缘, 无毛; 中层叶长圆形, 长约5毫米, 绿色, 外部者较宽, 向内部的渐狭, 先端浑圆, 两面无毛, 边缘具长睫毛; 内层叶卵形, 长1.5—2.5厘米, 先端浑圆, 全缘, 基部截形, 骤然收缩成长于叶片的长柄, 两面被短柔毛, 边缘具密缘毛。花葶细弱, 高约9厘米, 先端常俯垂, 被柔毛; 伞形花序有10余花; 苞片长圆形、狭椭圆形或线形, 长约4毫米, 腹面无毛, 背面具稀疏柔毛, 边缘具缘毛; 花梗丝状, 长短不等, 伸展的花梗长约7毫米, 具细柔毛; 花萼杯状, 长2.5—3毫米, 分裂达中部, 裂片半圆形, 表面无毛, 仅裂片的边缘具睫毛; 花冠紫红色, 直径约7毫米, 筒部短于花萼, 裂片倒卵形, 全缘或微波状。花期6月。

产于西藏(吉隆)。生于林下阴湿处, 海拔3750米。模式标本采自吉隆境内。

## 27. 糙伏毛点地梅(西藏植物名录) 尕滴莫布(藏语译音)

**Androsace strigillosa** Franch. in Bull. Soc. Bot. France 32: 10.1885, incl. var. *mutica*; D. Knuth in Engl. Pflanzenr. 22(IV-237): 185.1905; Hara in Fl. East Nepal 2: 100.1971; S. Gould in Hara et Williams, Enum. Fl. Pl. Nepal 3: 64. 1982. — *Androsace sarmentosa* var. *grandifolia* Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 498. 1882. — *Androsace strigillosa* var. *canescens* Marquand in Journ. Linn. Soc. Bot. 48: 201. 1929. syn. nov.

多年生草本。主根粗壮, 灰褐色, 直径6—7毫米, 具少数支根。莲座丛通常单生。叶3型, 外层叶卵状披针形或三角状披针形, 长6—9毫米, 宽3—4毫米, 干膜质, 先端及边缘疏被毛; 中层叶舌形或卵状披针形, 长6—15毫米, 宽2—2.5毫米, 草质, 两面被白色柔毛, 边缘具缘毛; 内层叶大, 绿色或灰绿色, 椭圆状披针形或倒卵状披针形, 长5—10(15)厘米, 先端锐尖或稍钝而具骤尖头, 下部渐狭, 基部下延成明显的柄, 两面密被多细胞糙伏毛和短柄腺体。花葶1至数枚, 高10—40厘米, 稍粗壮, 被开展硬毛和短柄腺体; 伞形花序多花; 苞片线状披针形, 长2—5毫米, 先端被短柔毛; 花梗长1—5厘米, 被稀疏柔毛和腺体; 花萼圆锥形或陀螺形, 长3.5—4毫米, 外面疏被短柔毛和腺毛, 分裂约达全长的1/3, 裂片阔卵形至卵状三角形, 先端锐尖或稍钝, 边缘密被小睫毛; 花冠深红色或粉红色, 直径8—9毫米, 裂片楔状阔倒卵圆形, 近全缘。花期6月; 果期8月。

产于西藏吉隆、加查、米林、林芝一带。生于山坡草地、林缘和灌丛中, 海拔3000—4200米。分布于锡金、不丹、尼泊尔。

西藏地区民间用全草治水肿。

## 28. 康定点地梅(植物分类学报) 川藏点地梅(西藏植物名录) 图版 45: 1—2

**Androsace limprichtii** Pax et Hoffm. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 17: 193.