

1—2 毫米,先端钝,背面沿中肋被稀疏硬毛,腹面无毛,边缘被缘毛;新枝上的叶椭圆形,毛被同内层叶。花葶单一,高 8—23 毫米,被长柔毛;伞形花序 2—4 花;苞片线形至线状披针形,长 2—4 毫米,先端钝,被疏毛;花梗短于苞片,长 0.5—3 毫米,被柔毛;花萼钟状,长 2—2.5 毫米,疏被毛,分裂约达中部,裂片狭卵形,先端钝,被缘毛,花冠淡红色,直径约 5 毫米,裂片倒卵形,先端圆形。蒴果球形,约与花萼等长。花期 6—7 月。

产于四川西部(乾宁、康定、稻城)。生于高山草甸和灌丛中,海拔 3600—4700 米。模式标本采自康定附近。

32. 腺序点地梅(西藏植物名录)

Androsace adenocephala Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 295. 1927; Marquand in Journ. Linn. Soc. Bot. **48**: 201. 1929; C.M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 224. 1986.

多年生草本。莲座状叶丛单生或少数丛生,新叶丛叠生于老叶丛上,无节间或具极短的节间。叶 3 型,外层叶三角状披针形,长 5—7 毫米,宽达 2 毫米,先端锐尖,褐色,带膜质,下部边缘白色;中层叶舌形,稍高出外层叶,长 5—7 毫米,先端圆钝,上半部被白色长达 1 毫米的毛;内层叶倒卵状披针形或窄倒披针形,长 1.5—3.5 厘米,先端钝,基部下延成柄,两面密被硬毛状白色长毛。花葶单一,高 3—4(7)厘米,被开展的长柔毛和具柄腺体;伞形花序近头状,具 5—6 花;苞片线状披针形至狭椭圆形,长 4—5 毫米,基部微呈囊状,被长柔毛和腺体;花梗长 2—5(8)毫米;花萼杯状,长约 2.5 毫米,分裂约达中部,裂片卵形,先端圆钝,被稀疏长柔毛和腺毛;花冠粉红色,喉部带黄色,直径 6—8 毫米,裂片近圆形,先端微呈波状。花期 5—6 月。

产于西藏东部工布江达至波密一带。生于高山草甸或灌丛中。模式标本采自米林附近。

本种叶形与狭叶点地梅 *A. stenophylla* (Petitm.) Hand.-Mazz. 颇相似,花梗有时亦可长于苞片,但植株较小,花序被腺毛,可以区别。

33. 江孜点地梅(西藏植物名录) 图版 46:5—8

Androsace cuttingii C. E. C. Fisch. in Kew Bull. **1937**: 99. 1937; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 224, 1986.

多年生草本。主根粗壮,木质,直径 5—8 毫米,自根颈发出多数斜升或倾卧的短枝,形成高 5—8 厘米的密丛。莲座状叶丛生于枝端,基部具多数历年残存的枯叶柄。叶 3 型,外层叶卵形至卵状披针形,长 3.5—5 毫米,通常为越年枯叶所遮盖,褐色,干膜质,两面近于无毛,边缘具疏缘毛;中层叶长圆状舌形至线状匙形,长 3—6 毫米,质地稍厚,背面上半部密被白色长毛,下半部褐色,无毛,腹面仅上半部近边缘被毛;内层叶倒披针形至倒卵状匙形,长 5—15 毫米,宽 2—4(5)毫米,草质,先端稍钝,基部渐狭,两面密被短硬毛。花葶高 5—20 毫米,被白色长柔毛;伞形花序 3—6(10)花;苞片线形至线状匙形,长 3—4 毫

米,先端锐尖或钝,被短柔毛和头状腺体;花梗通常短于苞片,长1—2(3)毫米;花萼钟状,长2.5—3毫米,被短柔毛,分裂约达全长的2/5,裂片卵形至卵状三角形,先端钝或稍锐尖,边缘具白色缘毛;花冠白色或粉红色,直径5—7毫米,筒部坛状,稍短于花萼,裂片倒卵形至阔倒卵形,近全缘。蒴果近球形,约与宿存花萼等长。花期4—6月。

产于西藏(拉萨、江孜、定结、日喀则和谢通门)。生于干旱的砂质山坡,海拔4000—4500米。模式标本采自日喀则。

34. **匍茎点地梅**(拉汉种子植物名称) **蔓茎点地梅**(西藏植物名录) 尕滴莫布(西藏,藏语译音)

Androsace sarmentosa Wall. in Roxb. Fl. Ind. **2**: 14. 1824; Duby in DC. Prodr. **8**: 49. 1844; Hook. f. in Bot. Mag. **102**: t. 6210. 1876, et in Fl. Brit. Ind. **3**: 498. 1882; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22** (IV-237): 183. 1905; Kitam. in Funa et Fl. Nep. Himal. 195. 1955; Hara in Fl. East Himal. 244. 1966; S. Gould in Hara et Williams, Fl. Pl. Nepal **3**: 63. 1982; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 224. 1986.

多年生草本,植株常单生,有时由着生于根出条上的少数莲座叶丛形成疏丛。莲座状叶丛直径3—5厘米,从中抽出花萼和2至数枚新根出条;根出条长5—8厘米,幼时被铁锈色卷曲长柔毛,老时呈棕褐色,毛稀疏,顶端聚生2—4对新叶。叶两型,外层叶舌状长圆形或椭圆状倒披针形,长不超过1厘米,两面被白色绢状长毛;内层叶倒披针形,长2—3厘米,直立或斜升,先端稍钝,毛被与外层叶相同,但常稍卷曲。花萼单一,高12—15厘米,带紫褐色,被铁锈色卷曲长柔毛;伞形花序通常多花;苞片线形或线状倒披针形,长3—5毫米,被绢状长毛和无柄腺体;花梗长于苞片,长6—12毫米,带紫褐色,密被铁锈色长毛;花萼阔钟形或杯形,长约3毫米,分裂达中部,裂片卵形或宽披针形,先端钝,边缘带膜质,先端和边缘具白色柔毛;花冠粉红色,直径约8毫米,筒部略短于花萼,裂片扇状倒卵形,先端波状。蒴果球形,稍长于花萼。花期6—7月;果期7—8月。

产于西藏聂拉木、吉隆等地。生于山谷林缘,海拔2800—4000米。分布于锡金、尼泊尔、克什米尔。

西藏地区民间用全草治水肿。

35. **南疆点地梅**(植物分类学报)

Androsace flavescens Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersburg. **32**: 506. 1888; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22**(IV-237): 183. 1905; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 224. 1986.

多年生草本,植株由着生于根出条上的莲座状叶丛形成疏丛。根出条通常3—4条自叶丛中抽出,长1—2厘米,近先端被疏柔毛,下部近于无毛,老时呈枣红色或深紫褐色。叶呈不明显的两型,外层叶舌状倒披针形,长5—10毫米,宽1.5—3毫米,先端钝,上半部被



1—4. 小丛点地梅 *Androsace minor* (Hand.-Mazz.) C. M. Hu et Y. C. Yang: 1. 植株一部分, 2. 外层叶, 3. 中层叶, 4. 内层叶。5—8. 江孜点地梅 *Androsace cuttingii* C. E. C. Fisch.: 5. 植株, 6. 外层叶, 7. 中层叶, 8. 内层叶。(邓盈丰绘)