

米,先端锐尖或钝,被短柔毛和头状腺体;花梗通常短于苞片,长1—2(3)毫米;花萼钟状,长2.5—3毫米,被短柔毛,分裂约达全长的2/5,裂片卵形至卵状三角形,先端钝或稍锐尖,边缘具白色缘毛;花冠白色或粉红色,直径5—7毫米,筒部坛状,稍短于花萼,裂片倒卵形至阔倒卵形,近全缘。蒴果近球形,约与宿存花萼等长。花期4—6月。

产于西藏(拉萨、江孜、定结、日喀则和谢通门)。生于干旱的砂质山坡,海拔4000—4500米。模式标本采自日喀则。

34. **匍茎点地梅**(拉汉种子植物名称) **蔓茎点地梅**(西藏植物名录) 尕滴莫布(西藏,藏语译音)

Androsace sarmentosa Wall. in Roxb. Fl. Ind. **2**: 14. 1824; Duby in DC. Prodr. **8**: 49. 1844; Hook. f. in Bot. Mag. **102**: t. 6210. 1876, et in Fl. Brit. Ind. **3**: 498. 1882; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22** (IV-237): 183. 1905; Kitam. in Funa et Fl. Nep. Himal. 195. 1955; Hara in Fl. East Himal. 244. 1966; S. Gould in Hara et Williams, Fl. Pl. Nepal **3**: 63. 1982; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 224. 1986.

多年生草本,植株常单生,有时由着生于根出条上的少数莲座叶丛形成疏丛。莲座状叶丛直径3—5厘米,从中抽出花萼和2至数枚新根出条;根出条长5—8厘米,幼时被铁锈色卷曲长柔毛,老时呈棕褐色,毛稀疏,顶端聚生2—4对新叶。叶两型,外层叶舌状长圆形或椭圆状倒披针形,长不超过1厘米,两面被白色绢状长毛;内层叶倒披针形,长2—3厘米,直立或斜升,先端稍钝,毛被与外层叶相同,但常稍卷曲。花萼单一,高12—15厘米,带紫褐色,被铁锈色卷曲长柔毛;伞形花序通常多花;苞片线形或线状倒披针形,长3—5毫米,被绢状长毛和无柄腺体;花梗长于苞片,长6—12毫米,带紫褐色,密被铁锈色长毛;花萼阔钟形或杯形,长约3毫米,分裂达中部,裂片卵形或宽披针形,先端钝,边缘带膜质,先端和边缘具白色柔毛;花冠粉红色,直径约8毫米,筒部略短于花萼,裂片扇状倒卵形,先端波状。蒴果球形,稍长于花萼。花期6—7月;果期7—8月。

产于西藏聂拉木、吉隆等地。生于山谷林缘,海拔2800—4000米。分布于锡金、尼泊尔、克什米尔。

西藏地区民间用全草治水肿。

35. **南疆点地梅**(植物分类学报)

Androsace flavescens Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersburg. **32**: 506. 1888; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22**(IV-237): 183. 1905; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 224. 1986.

多年生草本,植株由着生于根出条上的莲座状叶丛形成疏丛。根出条通常3—4条自叶丛中抽出,长1—2厘米,近先端被疏柔毛,下部近于无毛,老时呈枣红色或深紫褐色。叶呈不明显的两型,外层叶舌状倒披针形,长5—10毫米,宽1.5—3毫米,先端钝,上半部被