

3—6 花;苞片长圆形或狭椭圆形,长 2—3.5 毫米,先端钝,被短粗毛;花梗长达 1 厘米,长于苞片,被开展的粗毛;花萼阔钟形或杯状,长约 3 毫米,分裂达中部,裂片卵状三角形,先端钝,中上部密被粗毛;花冠粉红色,直径 6—8 毫米,筒部与花萼近等长,裂片楔状倒卵形,先端微呈波状。蒴果近球形,稍长于宿存花萼。花期 6—7 月;果期 8 月。

产于四川西南部、云南西北部和西藏东南部。生于山坡、林间草地和河边,海拔 3400—4200 米。模式标本采自云南德钦。

42. 察隅点地梅(植物分类学报)

Androsace zayulensis Hand.-Mazz. in Journ. Bot. Lond. **76**: 282. 1938; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 225. 1986.

多年生草本。莲座状叶丛着生于根出条上,有时间距极短,相互邻接,下部的叶丛枯萎,变褐色,但不凋落,使根出条呈柱状;有时叶丛疏离,根出条节间长可达 2.5 厘米,褐色,无毛。植株由多数根出条和叶丛紧密排列成高和直径各约 10 厘米的垫状体。叶稍呈两型,外层叶舌状,边缘具少数长睫毛,早枯,变褐色,内层叶较外层叶约大 2 倍,菱形,长可达 6 毫米,先端钝,基部稍扩展,无柄,质地厚,苍绿色,两面密被极短的硬毛,中肋宽,在背面稍明显。花萼短于叶丛,顶端具 2—4 花,与花梗、苞片均被极密的短硬毛;花梗长 3—5 毫米,果时弯拱展开;苞片长圆形,比花梗短 1 倍或有时与之近等长;花萼长约 3 毫米,分裂达中部以下,裂片卵状长圆形,先端钝,无脉纹;花冠(已枯萎)紫色(?),直径约 4 毫米,稍带肉质,裂片近倒卵状长方形,先端微凹,喉部具环状突起。蒴果稍长于花萼。

产于西藏东南部。生于向阳的石灰岩石壁上,海拔 3650—3950 米。模式标本采自西藏察隅。我们尚未采得标本。

本种与粗毛点地梅 *A. wardii* W.W. Smith 相近,但叶较小,近菱形,两面密被短硬毛,无明显缘毛,花梗短于叶丛,可以区别。

43. 大花点地梅(植物分类学报)

Androsace euryantha Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien. Math.-Nat. **61**: 137. 1924, et in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 282. 1927; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 225. 1986.

多年生草本,由多数根出条和莲座状叶丛形成密丛。根出条近直立,节间长 3—10 毫米,初被小硬毛及腺体,渐变无毛,呈栗褐色;下段节上枯老莲座丛呈小球形,径约 3 毫米,深褐色;当年生莲座丛位于顶端,直径 1—1.5 厘米。叶两型,外层叶狭舌形,长 1.5—2.5 毫米,先端被白色长髯毛;内层叶倒披针形或菱状倒卵形,长 3—8 毫米,腹面无毛,背面被短硬毛或仅沿中肋被毛,边缘具长短不一的白色髯毛;内层叶有叶柄,约与叶片等长,密被短硬毛和腺体。花萼单一,高 5—20 毫米,被开展的多细胞毛和无柄腺体;伞形花序 3—6 花;苞片椭圆形至狭长圆形,长 3—4 毫米,背面被毛;花梗与苞片等长或稍短,长 1.5—4 毫米,密被短硬毛;花萼钟状或陀螺状,长 2.5—3 毫米,草质,分裂略超过中部,裂片卵状长