

色或黄绿色;叶小,长圆形或椭圆形,长2—2.5毫米,先端近圆形,周边向内弯拱,两面无毛,仅边缘具流苏状睫毛。花单生,无花萼;花梗短,藏于叶丛中;苞片1—2枚,披针形,稍短于花萼,表面无毛,边缘膜质,具短缘毛;花萼狭钟状,分裂达中部或稍过之,裂片披针形或长圆形,先端钝,具明显的缘毛;花冠白色,直径约5毫米,筒部与花萼近等长或稍短,喉部收缩,微突起,裂片倒卵形或阔倒卵形。花期6月。

产于西藏南部(工布江达、错那、定结)。生于山顶草甸,海拔4000—5300米。模式标本采自工布江达附近。

52. 天山点地梅(植物分类学报)

Androsace ovczinnikovii Schischk. et Bobr. in Kom., Fl. URSS. 18: 729. 1952; Васильева в ПЯВЛОВ. Фл. Казаст. 7: 34. 1964; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. 24: 227. 1986.

多年生草本,植株由根出条上着生的莲座状叶丛形成疏丛。根出条细,节间长1.5—3厘米,幼时红褐色,疏被白色长柔毛,老时深紫褐色,变无毛。莲座状叶丛直径1.5—2.5厘米,灰绿色;叶为不明显的两型,外层叶线形或狭舌形,长5—7毫米,宽1—1.5毫米,黄褐色,先端钝,腹面近于无毛,背面中上部和边缘被柔毛;内层叶线形至线状倒披针形,长1—1.7厘米,宽1.5—2.5毫米,先端稍钝,腹面近于无毛,背面中部以上和边缘具长柔毛。花萼1—3枚自叶丛中抽出,细瘦,高1.5—4(10)厘米,被长柔毛;伞形花序3—5(8)花;苞片椭圆形至卵状披针形,长3—5毫米,疏被柔毛;花梗近等长,长5—8毫米,与花萼同被白色长柔毛;花萼杯状或阔钟状,长2.5—3毫米,分裂近达中部,裂片卵形,先端钝;花冠白色至粉红色,直径4.5—6毫米,裂片倒卵形,先端近全缘或微凹。花期6月。

产于新疆西部(伊犁地区)。生于山坡林下和山地草原,海拔2500—3100米。苏联哈萨克加盟共和国亦有分布。

53. 白花点地梅(内蒙古植物志)

Androsace incana Lam. Illustr. tabl. encycl. 1: 432. 1791; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 15: 280. 1927; Schischk. et Bobr. in Kom., Fl. URSS. 18: 225. 1952; 内蒙古植物志 5: 35. 1980. — *Androsace villosa* L. var. *incana* (Lam.) Duby in DC. Prodr. 8: 50. 1844; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. 22(IV-237): 192. 1905. — *Androsace hopeiensis* Nakai in Journ. Bot. Jap. 16: 8. 1940, syn. nov.

多年生草本,植株由着生于根出条上的莲座状叶丛形成密丛。根出条暗褐色,初被柔毛,渐变无毛,节间不明显或长达1.3厘米,通常短于叶丛。莲座状叶丛直径6—10毫米,基部有黄褐色枯叶;叶近等长或内层叶较外层叶稍长,披针形、狭舌形或狭倒披针形,长3—9毫米,宽0.8—2毫米,先端锐尖或稍钝,质地稍厚,两面上半部均被白色长柔毛,在背面有时极密。花萼单一,极短或高1—2(5)厘米,被长柔毛。花1—3(4)朵生于花萼端;苞片披针形至阔线形,长3—5毫米,基部稍突起,与花梗、花萼均被白色长柔毛;花梗通常