

短于苞片或有时与苞片近等长;花萼钟状,长约 3.5 毫米,分裂近达中部,裂片狭三角形,先端锐尖或稍钝;花冠白色或淡黄色,直径 5—8 毫米,喉部紧缩,紫红色或黄色,有环状凸起,裂片阔倒卵形,先端近圆形或微具波状圆齿。蒴果长圆形,稍长于花萼。花期 5—6 月。

产于河北北部、山西、内蒙古和新疆北部。生于山顶和向阳的山坡上,海拔 2000—3500 米。蒙古和苏联西伯利亚亦有分布。

采自新疆的标本苞片稍宽,呈阔线形至披针状椭圆形,有可能即苏联植物志中所载 *A. sericea* Ovcz.。因未见苏联标本,且区别甚微细,故在本志中乃作同一种处理。

54. 密毛点地梅(植物分类学报)

Androsace rockii W. E. Evans in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 130. 1927; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 296. 1927; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 228. 1986.

多年生草本,由着生于根出条上的叶丛形成密丛。根出条短,节间长 8—15 毫米,紫褐色,幼时被白色长柔毛。莲座叶丛直径 3—4 毫米;叶多数,近同型,长圆状匙形或匙形,长 8—15 毫米,宽 2—3 毫米,先端钝或锐尖,中肋较明显,两面密被长达 3 毫米的白色棉毛状长柔毛,近先端尤密。花萼通常单一,自叶丛中抽出,细弱,高 9—16 厘米,下部被稀疏开展的长柔毛,上部杂有头状腺体;伞形花序 3—6 花;苞片阔椭圆形,长约 3 毫米,被疏毛和腺体,基部微呈囊状;花梗长 2—2.5 厘米,细弱,被稀疏腺体;花萼杯状,长约 3 毫米,分裂达全长的 1/3,裂片阔卵圆形,长约 1 毫米,先端钝圆,微具 3 脉,边缘具腺状小缘毛;花冠粉红色,直径 8—10 毫米,裂片倒卵状长圆形,先端近截形或微凹。蒴果近球形,长约 4 毫米,短于宿存花萼。

产于云南西北部。生于山坡岩石上。模式标本采自维西附近。



55. 昌都点地梅(西藏植物名录) 图版 49: 4—5

Androsace bisulca Bur. et Franch. in Journ. Bot. Morot **5**: 103. 1891; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 280. 1927. — *Androsace villosa* L. var. *bisulca* (Bur. et Franch.) R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22**(IV-237): 192. 1905. — *Androsace brahamputre* Hand.-Mazz. in Journ. Bot. London **76**: 282. 1938.

55a. 昌都点地梅(原变种)

var. *bisulca*

多年生草本,株形为不规则的半球形密丛。主根木质。地上部分多分枝;枝上有历年残存的枯叶。当年生莲座状叶丛叠生老叶丛上,无间距,直径 1—2.5 厘米;叶呈不明显的两型,内层叶披针形至狭披针形或线形,长 4—5(10) 毫米,先端钝,全缘,背面中肋和边缘增厚,凸起,边缘被稀疏长柔毛,有时叶片先端和沿背面中肋亦被稀疏柔毛;外层叶较小,上面近顶端具画笔状长柔毛。花萼细弱,长 1.5—2(4) 厘米,疏被绵毛状长柔毛,顶端较密;伞形花序有花 2—8 朵;苞片狭披针形或宽线形,长 3—4 毫米,基部微呈囊状,中肋稍



1—3.唐古拉点地梅 *Androsace tangulashanensis* Yang et Huang: 1.植株, 2.根出条的一段, 3.苞片。
4—5.昌都点地梅 *Androsace bisulca* Bur. et Franch.: 4.植株, 5.叶片背面。(宁汝莲绘)