

多年生草本，植株由着生于根出条上的叶丛形成疏丛。根出条细，节间长5—20毫米，深褐色，疏被白色柔毛，老时变无毛。莲座状叶丛直径10—15毫米；叶两型，近等长，外层叶倒披针状长圆形，长6—7毫米，宽2—2.5毫米，先端钝，污白色，膜质，腹面无毛，背面中肋突起，先端微被毛，边缘具短缘毛；内层叶狭倒披针形或匙形，长6—7毫米，宽达2毫米，草质，先端圆钝，腹面近于无毛，背面先端和边缘具白色长柔毛。花葶单一，高(3)5—6厘米，被开展的白色柔毛；伞形花序3—5花；苞片线形，长4—5毫米，疏被白色柔毛；花梗长8—10毫米，被开展的柔毛；花萼阔钟形，长约3毫米，分裂近达中部，裂片狭三角形，被白色柔毛，花冠粉红色，直径约9毫米，裂片阔倒卵形至阔楔形，先端近全缘。花期6月。

产于西藏东南部。生于潮湿的南坡，雪崩槽中，海拔3000—3500米。模式标本采自西藏波密。

#### 58. 球形点地梅(西藏植物名录)

**Androsace globifera** Duby in DC. Prodr. **8**: 48. 1844; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 500. 1882; R. Kunth in Engl. Pflanzenr. **22** (IV-237): 203. 1905; Hand.-Mazz. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 279. 1927. et **16**: 163. 1931; S. Gould in Hara et Williams, Enum. Fl. Pl. Nepal **3**: 63. 1982.

多年生草本，植株由多数着生于根出条上的莲座状小叶丛形成疏丛。根出条深褐色，节间长3—8毫米。莲座状叶丛球形，直径3—6毫米；叶两型，外层叶褐色或深褐色，卵形或长圆状卵形，长约4毫米，微内弯，先端锐尖，近于无毛；内层叶绿色，较狭窄，常为匙形，先端密被白色绵毛状长毛，边缘被柔毛并杂有短腺毛。花单生或2朵于当年生叶丛中，无苞片或具2枚与花萼近等长的苞片；花葶长达7毫米；花梗与花葶近等长或稍长；花萼筒状，膜质，长约3.5毫米，分裂达全长的1/3，裂片长圆形或披针形，先端钝，被长柔毛；花冠白色，直径约6毫米，喉部紫色或棕黄色，筒部较细长，微露出花萼，裂片倒卵形。蒴果陀螺形，长于花萼。花期6—7月。

产于西藏西南部(扎达)。生于山坡草地，海拔3600米。分布于印度、不丹、尼泊尔。

#### 59. 紫花点地梅(西藏植物名录) 图版 50: 1—6

**Androsace selago** Klatt in Linnaea **32**: 292. 1863; Watt in Journ. Linn. Soc. Bot. **20**: 18. t.18A. 1882; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 500. 1882; R. Knuth in Engl. Pflanzenr. **22**(IV-237): 202. 1905; C. M. Hu et Y. C. Yang in Act. Phytotax. Sin. **24**: 229. 1986.

多年生草本，具粗壮的木质主根，地上部分为一坚实的半球形垫状体，由多数密被鳞覆枯叶的根出短枝紧密排列而成。当年生叶丛叠生于老叶丛上，无间距，直径约3毫米。叶呈不明显两型，外层叶线形至狭长圆形，长2—4毫米，宽可达1毫米，淡褐色，背面沿中肋龙骨状突起，中上部被白色多细胞长柔毛，腹面无毛；内层叶稍短于外层叶，毛被较