

11. Soc. Bot. France **56**: 464. 1909.

二年生柔弱草本，全株无粉，具多数须根。叶卵形至矩圆形，长 1.5—3.5 厘米，宽 1—2.5 厘米，先端圆形，基部浅心形，边缘具牙齿或重牙齿，齿锐尖或稍钝，干时膜质，上面疏被多细胞柔毛，下面沿叶脉被毛，中肋稍宽，侧脉 4—5 对，在下面稍明显；叶柄具狭翅，长 1—3 厘米，被白色多细胞柔毛。花葶纤细，高 3—13 厘米，疏被柔毛；伞形花序 1—2 轮，每轮 2—6 花；苞片钻形，长 2—4 毫米，先端锐尖；花梗纤细，无毛，长 1.5—2.5 厘米；花萼阔钟状，长 3—5 毫米，近膜质，无毛或近于无毛，分裂略超过中部，裂片三角形至卵状披针形，锐尖，有时尖端稍外反；花冠粉红色，冠筒口周围黄色，冠筒长 8—9 毫米，冠檐直径 1—1.5 厘米，裂片倒卵形，先端具深凹缺；长花柱花：雄蕊着生处距冠筒基部 2—2.5 毫米，花柱长约 5.5 毫米，接近筒口；短花柱花：雄蕊距冠筒基部 7—7.5 毫米处着生，花柱长 3—3.5 毫米，稍高出花萼。蒴果球形，短于花萼。

产于云南东北部(大关)和四川南部(南川)。生长于湿润岩石上和竹林下。模式标本采自云南大关成风山。

10. 景东报春 (中国高等植物图鉴) 图版 2: 1—4

Primula interjacens Chen in Act. Phytotax. Sin. **1**: 175. fig. 1. 1951; Chen ex W. W. Smith et Fletcher in Trans. Roy. Soc. Edinb. **61**(2):450. 1946, sine descr. lat.; 中国高等植物图鉴 **3**: 247. fig. 4447. 1974; 云南种子植物名录 **2**: 1503. 1984.


10a. 景东报春(原变种)

var. *interjacens*

多年生草本。根状茎木质，长 1.5—5 厘米，直径可达 7 毫米，有多数褐色枯叶柄，顶端发出 1—2 叶丛，向下发出紫褐色的主根和少数支根。叶多数，叶片阔卵形至近圆形，长 2—5.5 厘米，宽 2—5 厘米，先端圆形，基部心形，边缘具波状圆齿，新叶干时膜质，上面被纤细的柔毛，有时沿中肋及侧脉被少量乳黄色粉，下面密被易脱落的乳黄色粉，沿叶脉被毛，侧脉 4—5 对，在下面明显，老叶质地稍厚，上面常呈泡状隆起，下面因叶脉隆起而呈蜂窝状；叶柄纤细，具极狭的翅，长 3—8 厘米，被褐色柔毛，基部稍增宽。花葶高 8—14 厘米，紫褐色，被柔毛；伞形花序 1—2 轮，每轮 3—8 花，被稀薄乳黄色粉；苞片披针形至矩圆形，长 4—7 毫米，先端锐尖，背面被柔毛；花梗纤细，长 1.5—3.5 厘米，被柔毛；花萼钟状，长约 5 毫米，外面被柔毛，分裂约达中部，裂片卵形或卵状三角形，先端锐尖；花冠淡红色，初露出花萼时密被黄粉，冠筒长 9—10 毫米，冠檐直径约 2 厘米，裂片阔倒卵形，先端深 2 裂；长花柱花：雄蕊着生处距冠筒基部约 2.5 毫米，花柱长达冠筒口；短花柱花：雄蕊着生处距冠筒基部约 8 毫米，花柱长约 2 毫米。蒴果约与花萼等长。花期 6 月。

云南景东特有种。生于岩石上，海拔 2200 米。模式标本李鸣岗 2927 (原始记载误作刘瑛 2927) 采自景东。

10b. 光叶景东报春(变种) (新拟)



1—4. 景东报春 *Primula interjacens* Chen, 1. 植株; 2. 花萼; 3. 长花柱花; 4. 短花柱花。5—6. 绒毛报春 *Primula tsiangii* W. W. Smith, 5. 植株; 6. 果期花萼。7—8. 习水报春 *Primula lithophila* Chen et C. M. Hu, 7. 叶片; 8. 果期花萼。(邓盈丰绘)