

凹缺间常有 1 小齿;长花柱花: 雄蕊着生处距冠筒基部约 2 毫米, 花柱略高出冠筒口;短花柱花: 雄蕊接近冠筒喉部环状附属物, 花柱长 2—3 毫米。蒴果长圆形, 与花萼近等长。花期 5—6 月, 果期 9 月。

产于我国西藏工布江达、米林、林芝、波密。生于云杉林和高山栎林下, 海拔 3100—3500 米。模式标本采自米林县境内。

35. 掌叶报春(中国高等植物图鉴) 图版 7: 5—8

Primula palmata Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat. **61**: 132. 1925, et in Act. Hort. Gothoburg. **2**: 99. fig. 1—2. 1925—1926; W. W. Smith et Fletcher in Trans. Bot. Soc. Edinb. **34**: 106. 1944; Fang in Act. Univ. Szechuan. **1**: 69. 1956.

多年生草本, 具横卧的根状茎, 并常自叶丛基部发出匍匐枝; 匍枝纤细, 长可达 10 厘米, 节间长 1—5 厘米, 节上生 1 叶, 顶端着地生根。叶 1—4 枚丛生, 轮廓近圆形, 直径 1.5—8 厘米, 基部心形, 边缘掌状 5—7 裂, 深达叶片的 $\frac{3}{4}$ 或更深, 裂片再次 3 裂, 小裂片具 1—3 牙齿, 先端锐尖, 上面深绿色, 被多细胞柔毛, 下面淡绿色, 沿叶脉被多细胞柔毛, 中肋与 2 对基出侧脉在下面显著; 叶柄长 2—19 厘米, 被褐色长柔毛, 初时毛甚密, 后渐稀疏。花萼纤细, 高 4.5—17 厘米, 疏被柔毛; 伞形花序顶生, 1—4 花; 苞片线状披针形, 长 5—8 毫米, 被毛; 花梗长 7—25 毫米, 直立, 疏被毛; 花萼钟状, 长 5—7 毫米, 外面微被毛, 分裂约达全长的 $\frac{2}{3}$, 裂片披针形, 具 3 纵脉; 花冠玫瑰红色或淡红色, 冠筒长 8.5—11 毫米, 冠檐直径 1.5—2 厘米, 裂片阔倒卵形, 宽 5—8 毫米, 先端 2 裂, 裂片边缘具小圆齿; 长花柱花: 雄蕊着生处距冠筒基部约 2 毫米, 花柱长达冠筒口; 短花柱花: 雄蕊着生于冠筒中上部, 距基部 6—9 毫米, 花柱长约 2 毫米。花期 5—6 月。

产于四川(红原、松潘、马尔康、茂汶、理县和灌县北部高山)。生于林下和山谷石缝中, 海拔 3000—3800 米。模式标本采自松潘附近。

36. 七指报春(中国高等植物图鉴) 七裂报春(拉汉种子植物名称)

Primula septemloba Franch. in Bull. Soc. Bot. France **32**: 265. 1885; Pax in Bot. Jahrb. **10**: 169. 1889, et in Engl. Pflanzenr. **22** (IV-237): 30. 1905; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 42. 1889; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 734. 1936; Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. **9**: 280. 1939; W. W. Smith et Fletcher in Trans. Bot. Soc. Edinb. **34**: 109. 1944; 中国高等植物图鉴 **3**: 793. 1974; 云南种子植物名录 **2**: 1511. 1984.

36a. 七指报春(原变种)

var. **septemloba**

多年生草本。根状茎短, 具多数细长须根, 无匍匐枝。叶通常 2—3 枚丛生; 叶片轮廓近圆形, 直径 5—10(15) 厘米, 或宽度稍大于长度, 基部心形, 边缘掌状 7—9 裂, 深达叶片半径的 $\frac{1}{3}$, 裂片阔三角形, 具 1—2 对缺刻状粗齿和不整齐的三角形小牙齿, 上面深绿