

长 6—8 毫米,疏被柔毛;花萼钟状,长约 9 毫米,外面疏被短柔毛,分裂近达中部,裂片卵状披针形,先端锐尖;花冠蓝紫色,冠檐直径 2—2.5 厘米,裂片倒卵形,先端具深凹缺,凹缺间常具 1 小尖头;长花柱花:冠筒与花萼近等长,雄蕊着生于冠筒中部,花柱长达冠筒口;短花柱花:冠筒长于花萼约 3 毫米,雄蕊近冠筒口着生,花柱长 3—4 毫米。花期 5 月。

本种为一稀有种,迄今仅有一号模式标本,采自云南大关。生长于湿润的岩石上。

102. 二郎山报春(新拟) 西南报春(拉汉种子植物名称) 图版 22: 4—7

Primula epilosa Craib in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **11**: 171. 1919; W. W. Smith et Fletcher in Trans. Roy. Soc. Edinb. **61**(2):309. 1944. — *Primula cheniana* Fang in Act. Univ. Szechuan. **1**:80. 1956. syn. nov.

常绿多年生草本,具粗短的根状茎和多数粗长须根。开花时当年生新叶基部有鳞片;鳞片矩圆形至矩圆状披针形,长 6—20 毫米,干时褐色。叶矩圆状倒卵形至矩圆状倒披针形,开花时新叶常未充分发育,老叶长 5—10 厘米宽 2—4 厘米,先端圆形,基部渐狭窄,边缘有具胼胝质尖头的三角形牙齿,干时近革质,上面因叶脉下陷而呈泡状,无毛,疏被小腺体,下面沿叶脉被短柄小腺体,老时常具白色肤屑状物,中肋稍宽,侧脉 11—13 对,与网脉在下面均明显凸起;叶柄长 5—25 毫米。花萼高 3.5—14 厘米,疏被小腺体;伞形花序(1) 2—5 花;苞片自三角形的基部渐尖成线形,长 3—10 毫米;花梗长 4—20 毫米,疏被小腺体;花萼钟状,长(7)9—11 毫米,外面被小腺体,分裂约达中部,裂片卵形或卵状披针形,先端锐尖或短渐尖,边缘具小缘毛;花冠淡紫蓝色,喉部无环状附属物,冠檐直径约 3 厘米,裂片阔倒卵形,宽达 12 毫米,先端深 2 裂;长花柱花:冠筒长约 10 毫米,雄蕊距冠筒基部约 4 毫米着生,花柱微伸出筒口;短花柱花:冠筒长 14—17 毫米,雄蕊近冠筒口着生,花柱长 4—5.5 毫米。花期 4—5 月。

产于四川西部(天全、泸定)。生长于林缘和阴湿岩石上,海拔 2000—2900 米。模式标本采自天全二郎山。

本种与大叶宝兴报春(*P. davidii* Franch.)近缘,惟全株无多细胞毛,花冠裂片深 2 裂,可以区别。

103. 大叶宝兴报春(中国高等植物图鉴) 大卫报春(拉汉种子植物名称)

Primula davidii Franch. in Bull. Soc. Bot. France **33**: 66. 1886; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, ser. 2, **10**: 56, t. 14, fig. A. 1887; Pax in Engl. Pflanzenr. **22** (IV—237): 43. 1905; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 504. 1905; Balf. f. in Trans. Bot. Soc. Edinb. **26**: 188. 1913; W. W. Smith et Fletcher in Trans. Roy. Soc. Edinb. **61**(2): 309. 1944; 中国高等植物图鉴 **3**: 804. 1974.

多年生草本,全株无粉。根状茎粗短,具多数纤维状须根。叶丛基部具少数黄褐色卵状披针形鳞片。叶矩圆形至倒卵状矩圆形,连柄长(5)8—18 厘米,宽 1.5—4 厘米,先端



1—3.短茎报春 *Primula breviscapa* Franch., 1. 植株; 2. 花萼; 3. 长花柱花。4—7. 二
郎山报春 *Primula epilosa* Craib, 4. 植株; 5. 花萼; 6. 短花柱花; 7. 长花柱花。(余峰绘)