

圆形,基部渐狭窄,边缘具啮蚀状锐尖牙齿,干后近革质,上面多少呈泡状隆起,无毛或中肋基部被少数短硬毛,下面侧脉及网脉隆起,多少呈蜂窝状,沿中肋被开展的褐色粗硬毛;叶柄通常甚短,分化不明显。花葶高8—20厘米,被铁锈色毛;伞形花序2—10花;苞片披针形,先端渐尖,长约为花梗的1/2;花梗长10—15毫米,疏被短硬毛;花萼钟状,长9—10毫米,被微柔毛,微具5脉,分裂近达中部,裂片卵形或卵状三角形,先端锐尖;花冠蓝紫色,冠筒长约12毫米,喉部无环状附属物,冠檐直径2—3厘米,裂片阔倒卵形,先端圆形,具1小凹缺;长花柱花:雄蕊距冠筒基部约3.5着生,花柱长达冠筒口。

本种为一稀有种,模式标本采自四川宝兴,无详细地点,最近作者在芦山县大腔岩再次采得。

本种外貌与城口报春 *P. fagosa* Balf. f. et Craib 相似,但毛被和叶缘牙齿均不同。

104. **城口报春**(新拟) 蜀报春(拉汉种子植物名称),川东粗叶报春(中国高等植物图鉴)

Primula fagosa Balf. f. et Craib in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **11**: 172. 1919; W. W. Smith et Fletcher in Trans. Roy. Soc. Edinb. **61**(2): 310. 1944.

多年生草本,全株无粉。根状茎粗短,具多数纤维状须根。开花期叶丛基部外围有松散的鳞片;鳞片矩圆形,长1.5—2.5厘米,褐色。叶倒卵状矩圆形至倒卵状披针形,长5—15厘米,宽3—7厘米,先端圆形,基部楔状渐窄,边缘有稀疏的具胼胝质尖头的小齿,干后坚纸质,上面因网脉下陷而呈泡状隆起,下面沿中肋、侧脉和三级脉被硬毛状多细胞毛,侧脉10—13对,与网脉在下面均明显隆起;叶柄短,长不超过1.5厘米。花葶高6—15厘米,疏被柔毛;伞形花序3—7花;苞片自卵形的基部渐尖成线形,长4—7毫米;花梗稍粗壮,直立,长约1.5厘米,被短柔毛;花萼钟状,长8.5—10毫米,外面被短柔毛,分裂略超过全长的1/3,裂片卵形,先端短渐尖,边缘具小缘毛;花冠蓝紫色,冠檐直径2—3厘米,裂片阔倒卵形,先端具凹缺;长花柱花:冠筒长约12毫米,雄蕊距冠筒基部约5毫米着生,花柱长近达冠筒口;短花柱花:冠筒长约15毫米,雄蕊近冠筒口着生,花柱约与花萼等长。蒴果球形,与萼筒等长。花期5月,果期6月。

四川东部特有种,仅见于城口;生长于林间草地,海拔1450米。

105. **亮叶报春**(中国高等植物图鉴) 海螺报春(拉汉种子植物名称) 图版23: 1—3

Primula hylobia W. W. Smith in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 251. 1927; W. W. Smith et Fletcher in Trans. Roy. Soc. Edinb. **61**(2): 311. 1944; 中国高等植物图鉴 **3**: 804. 1974; 云南种子植物名录 **2**: 1503. 1984, p. p.

多年生草本。根状茎粗短或稍伸长,具多数粗长须根。开花期叶丛基部具2—3轮覆瓦状排列的鳞片;鳞片矩圆形至短圆状披针形,长1—3厘米,干时褐色。叶倒卵形或阔倒披针形,先端圆形,基部渐狭窄,边缘具不整齐的圆齿或微呈浅裂状,齿端具胼胝质小尖