

头,干时纸质,上面疏被小腺体,下面密被腺毛状短毛,沿中肋被多细胞柔毛,中肋稍宽,侧脉 12—16 对,在下面微隆起,网脉显著;叶柄极短或长达 2 厘米。花葶高 18—24 厘米,多少被短柔毛;伞形花序 6—11 花;苞片自卵形的基部渐尖成披针形,长 3—5 毫米;花梗长 1.5—2.5 厘米,直立,被腺毛;花萼钟状,长 8—9.5 毫米,外面疏被小腺毛,分裂近达中部,裂片三角形,先端稍渐尖,边缘具小缘毛;花冠蓝色,冠筒长 13—14 毫米,喉部无环状附属物,内面被微柔毛,冠檐直径约 2 厘米,裂片楔状长方形,先端微具凹缺;长花柱花:雄蕊距冠筒基部约 5 毫米着生,花柱略高出筒口。蒴果近球形,与萼筒近等长。花期 4 月。

产于云南。为一稀有种,迄今仅有邓西蒙 (Siméon Ten) 387 号采自永胜的模式标本。生长于林下。

106. 云南卵叶报春(中国高等植物图鉴) 克氏报春(拉汉种子植物名称)

Primula klaveriana Forr. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **15**: 252. 1927; W. W. Smith et Fletcher in Trans. Roy. Soc. Edinb. **61**(2): 311. 1944; 中国高等植物图鉴 **3**: 804. 1974; 云南种子植物名录 **2**: 1504. 1984.

多年生草本。根状茎肥厚,稍伸长,具多数长根。花期叶丛基部有鳞片;鳞片矩圆形,长 1—3 厘米,宽 5—10 毫米,干时褐色。叶椭圆状倒卵形至矩圆状倒卵形,长 4—14 厘米,宽 3—8 厘米,果期长可达 35 厘米,宽至 15 厘米,先端圆形或微凹,基部钝或阔楔形,边缘具小圆齿,干时纸质至坚纸质,上面散布少数小腺体,下面密被短腺毛,沿中肋被多细胞柔毛,侧脉 12—18 对,在下面显著;叶柄分化不明显或长达 1 厘米。花葶稍粗壮,高 10—12 厘米,果期高可达 30 厘米,多少被柔毛;伞形花序 2—10 花;苞片自较宽的基部渐尖成披针形,长 6—12 毫米,被微柔毛;花梗长约 1 厘米,果期长达 2 厘米,被柔毛;花萼钟状,长 11—13 毫米,外面被短柔毛,分裂略超过中部,裂片卵状披针形,先端锐尖;花同型,花冠蓝色或紫蓝色,冠筒长约 18 毫米,冠檐直径 2—2.5 厘米,裂片倒卵形,全缘。雄蕊着生于冠筒上部,花药微露出筒口,花柱长达 20 毫米,高出花药约 4 毫米。花期 4 月。

产于云南西部腾冲、泸水片马一带。生长于溪边和灌丛缘向阳处,海拔 2700—3700 米。缅甸北部亦有分布。模式标本采自缅甸北部与云南接壤处。

107. 青城报春(新拟) 图版 23: 4—7

Primula chienii Fang in Act. Univ. Szechuan. **1**: 83, fig. 10. 1956.

多年生草本,全株无毛,无粉状附属物。根状茎稍粗壮,长可达 4 厘米,具多数纤维状须根,有时顶端具分枝。开花时叶丛基部具少数鳞片;鳞片三角形至披针形,长 5—15 毫米,宽约 2 毫米,先端渐尖。叶片椭圆状至倒卵状矩圆形,长 (1.5)3—9 厘米,宽 1.5—4.8 厘米,先端圆形,基部近圆形或阔楔形,边缘具不明显的波状钝齿,干时薄纸质,上面深绿色,下面淡绿色,中肋稍宽,侧脉 8—9 对,在下面显著;叶柄稍纤细,长为叶片的 1/4—1/2,有时与叶片等长。花葶高 (2)3.5—12 厘米,果时高可达 16 厘米,疏被小腺体;伞形花序 2—8 花;苞片披针形,长 4—8 毫米,具小缘毛;花梗长 1—1.5 厘米,果时长可达 2 厘