

发出,叶片倒卵状矩圆形至倒披针形,长4—15厘米,宽1.8—5厘米,先端圆形,基部渐狭窄,下延至叶柄成翅状,边缘具不整齐的啮蚀状小牙齿,中肋宽扁,侧脉在下面稍隆起;叶柄极短或长达叶片的1/3。花萼1—2枚自叶丛中抽出,常带紫色,开花时长4.5—15厘米,果时长可达30厘米,具伞形花序2—4(6)轮,每轮具6—12花;苞片线形,长1—2.2厘米;花梗带红色,长3—10毫米;花萼窄钟形,长7—10毫米,分裂略超过中部,裂片窄披针形,带红色;花冠深橙红色,冠檐直径8—10毫米,长花柱花:花冠筒长8—10毫米,雄蕊着生处距冠筒基部约5.5毫米,花柱长约9毫米;短花柱花:花冠筒长9—14毫米,雄蕊着生处距冠筒基部约11.5毫米,花柱长约5毫米,花冠裂片倒卵形或倒卵状矩圆形,先端具较深的凹缺。蒴果近球形,直径约5毫米。花期5月。

产于云南西北部(剑川)和四川西南部(盐源、金阳)等地。生长于山坡草地、林缘湿地和水沟边,海拔2500—3500米。模式标本采自云南剑川。

128. 小灯笼台报春(西藏植物志)

Primula prenantha Balf. f. et W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. 9: 191. 1915; W. W. Smith et Fletcher in Trans. Bot. Soc. Edinb. 33: 166. 1941; 西藏植物志 3: 830. 1986. ——*Primula microloma* Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien, 61: 134. 1924, et Symb. Sin. 7: Taf. 13, Abb. 6. 1936. ——*Primula brachystoma* auct. non W. W. Smith: Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. 9: 276. 1939.

128a. 小灯笼台报春(原亚种) 图版27: 5—7

subsp. *prenantha*

多年生小草本。叶丛自极短的根茎发出,具丛生的支根和多数纤维状须根;叶片矩圆形倒卵形或倒卵状椭圆形,长3.5—9厘米,宽1.5—3厘米,先端圆形,基部渐狭窄,边缘具啮蚀状小牙齿,上面深绿色,下面淡绿色,微被粉质腺体,中肋在下面宽扁,稍隆起,侧脉9—15对,与中肋成55—70度角;叶柄不明显或长达叶片的1/3,具翅。花萼1—2枚自叶丛中抽出,高10—15厘米,果时高可达20厘米,近顶端被粉质腺体,具伞形花序1—2轮,每轮2—8花;苞片线形或线状披针形,长3—8毫米;花梗长5—15(20)毫米,开花时稍下弯,果时直立;花萼钟状,长3.5—5.5毫米,裂片长1—1.5毫米,三角形,全缘,稍稍呈舌状并具1—2小齿;花黄色,同型,花冠筒长5—7.5毫米,喉部具环状附属物,裂片矩圆形倒卵形,长2—3.5毫米,近直立或仅稍开张,冠檐直径6—9毫米,雄蕊着生于冠筒中上部,距冠筒基部约5.5毫米,柱头和花药达同一高度。蒴果近球形,直径约5毫米,稍长于花萼。花期5—6月。

产于云南西北部(贡山)和西藏东南部(隆子、朗县、墨脱)。生长于高山草地和沼泽草甸中,海拔2400—3300米。分布于锡金、不丹和缅甸北部。模式标本采自锡金。

近缘种 *P. brachystoma* W. W. Smith 产于缅甸北部,叶先端锐尖,具短骤尖头,花