

产于我国西藏察隅县南部。生于花岗岩石缝中,海拔 3600 米。模式标本采自米什米山地。

本种为一稀有种,除模式标本外,未再次采得。叶丛生于短根出条上,花同型,与其它外貌近似的种类均不同。

214. 淡粉报春(西藏植物志)

Primula tayloriana Fletcher in Journ. Roy. Hort. Soc. **74**: 210. fig. 70. 1949; W. W. Smith et Fletcher in Trans. Bot. Soc. Edinb. **35**: 189. 1949; 西藏植物志 **3**: 778. 1986.

多年生草本。根状茎粗短,向下发出多数纤维状须根。叶倒卵形,连柄长 4—5 厘米,宽 2—3 厘米,先端圆形,基部渐狭窄,下延成具翅的柄,边缘具小牙齿或小圆齿,上面秃净,下面被稀薄乳黄色粉,中肋及 6—8 对侧脉两面均明显。花葶稍粗壮,高 4—10 厘米,下部散布少量黄粉,近顶端明显被粉;伞形花序 2—8 花,被乳黄色粉;苞片线形至线状披针形,长 3—7 毫米,基部不膨大;花梗长 5—15 毫米,近直立;花萼钟状,长 5—7 毫米,分裂达全长的 2/3,裂片披针形,稍开张,先端锐尖,具明显的中肋;花冠蓝紫色,冠筒口周围淡黄色,冠筒长 11—12 毫米,冠檐直径 1.6—2.5 厘米,裂片倒卵形,宽 5—6 毫米,先端具深凹缺;长花柱花:雄蕊着生于冠筒中部,花柱与冠筒等长或略伸出筒口;短花柱花:雄蕊着生处距冠筒基部约 10 毫米,接近冠筒口,花柱长达冠筒中部。蒴果长圆形,略长于宿存花萼。

我国西藏特有种。模式标本采自米林县境内雅鲁藏布江河谷。生长于岩石缝中。海拔约 3000 米。

本种除模式标本外尚无人再次采得,其外形与藏南粉报春 *P. jaffreyana* King 极相似,惟花萼钟状,分裂达全长的 2/3,裂片稍开张,花冠喉部无环状附属物,可以区别。

215. 米仓山报春(新拟)

Primula scopulorum Balf. f. et Farrer in Trans. Bot. Soc. Edinb. **27**: 243. 1917; W. W. Smith et Fletcher in Trans. Roy. Soc. Edinb. **61**(1); 43. 1943, pro syn. sub *P. kialensis* Franch.

多年生草本,具粗短的根状茎和多数须根。叶丛高 5—6 厘米,基部无鳞片;叶片椭圆形至倒卵状椭圆形,长 2—4.5 厘米,宽 1—2.3 厘米,先端钝圆,基部渐狭窄,边缘具不整齐的钝牙齿,上面秃净,下面密被白粉(干后变乳黄色),但侧脉及三级脉清晰可见;叶柄具翅,长为叶片的 1/4—1/3。花葶直立,高 2.5—6 厘米,基部微被粉;伞形花序(2)3—5 花;苞片披针形,长 4—6 毫米,腹面被粉;花梗长 8—20 毫米,微被粉;花萼钟状,长 5—7 毫米,具 5 棱,外面疏被粉,分裂略超过中部或达全长的 2/3,裂片披针形,内面密被粉;花冠紫红色或淡紫色,冠檐直径 1.5—2 厘米,裂片倒卵形,先端 2 深裂;长花柱花:冠筒长 12—13 毫米,花柱长 9—10 毫米,近达冠筒口,雄蕊着生处距冠筒基部约 2 毫米;短花柱