

多年生小草本，全株无粉。根状茎短，具多数须根。叶丛高1—5厘米，叶片卵形、椭圆形或匙形，长6—30毫米，宽2—16毫米，先端钝或圆形，基部楔形或近圆形，全缘，很少具稀疏不明显的钝齿，鲜时稍带肉质，两面秃净，中肋稍宽，侧脉不明显；叶柄纤细，具狭翅，与叶片近等长或长于叶片1—3倍。花葶1—6枚自叶丛抽出，有时甚短，深藏于叶丛中并短于花梗，有时高可达13厘米，长于叶丛和花梗；花1—10朵生于花葶端；苞片狭矩圆形至披针形，长4—10毫米，先端钝或锐尖，基部稍下延成垂耳状；花梗纤细，长2—8厘米；花萼狭钟状，长3—5毫米，明显具5棱，沿棱脊常染紫色，分裂深达全长的 $1/3$ — $1/2$ 裂片披针形或近三角形，稍锐尖；花冠粉红色或紫红色，冠筒口周围黄色，冠筒长4.5—7毫米，通常稍长于花萼，冠檐直径7—10毫米，裂片阔倒卵形，先端2深裂；长花柱花：雄蕊着生于冠筒中部，花柱伸出冠筒口；短花柱花：雄蕊着生于冠筒上部，花药微露出筒口，花柱长达冠筒中部。蒴果筒状，稍长于花萼。

产于我国西藏，自扎达、噶尔、仲巴沿雅鲁藏布江河谷分布至八宿地区。生长于山坡湿草地和沼泽化草甸中，海拔3200—4800米。印度、尼泊尔、锡金、不丹均有分布。模式标本采自西藏西南部。

本种的花葶通常短于花梗，有时亦可长于叶丛和花梗，与天山报春 *P. nutans* Georgi 相似，但后者花萼裂片边缘具小腺毛，极易区别。

234. 荨麻叶报春(拉汉植物名称) 图版 46: 5


Primula urticifolia Maxim. in Bull. Acad. St. Petersburg. **27**: 497. 1881; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 43. 1889; Pax in Engl. Pflanzenr. **22**(IV-237): 111. 1905; W. W. Smith et Fletcher in Trans. Roy. Soc. Edinb. **61**(1): 56. 1943.

多年生柔小草本，高3—8厘米，具极短的根状茎和多数须根。叶丛疏松，叶片近圆形或阔卵形，直径3—7毫米，基部楔形，边缘近掌状5—11裂，裂深约1毫米，小裂片线状矩圆形或近三角形，先端钝，无毛，两面散布有少数小腺体，中肋在下面明显，侧脉隐蔽；叶柄具狭翅，长于叶片2—5倍。花葶纤细，高2—7厘米；花1—3朵生于花葶端；苞片钻形，长3—5毫米，基部下延；花梗长5—15毫米，疏被小腺体，顶端稍增粗；花萼狭钟状，长4—6毫米，具5棱，分裂深达中部，裂片卵形至矩圆形，先端稍锐尖；花冠玫瑰红色，冠筒约长于花萼1倍，喉部无环状附属物，冠檐直径1—1.5厘米，裂片阔倒卵形，先端具深凹缺；长花柱花：雄蕊靠近冠筒基部着生，花柱长与花萼相等或微高出花萼；短花柱花：雄蕊着生于冠筒中部，花柱长约2毫米。蒴果稍短于宿存花萼。

产于青海东部(大通、西宁)。生长于石灰岩石缝中，海拔约4000米。模式标本采自大通。

235. 光叶粉报春(西藏植物志) 图版 47: 1—4

Primula glabra Klatt in Linnaea **37**: 500. 1872; Watt in Journ. Linn. Soc.



1—2.天山报春 *Primula nutans* Georgi, 1.植株; 2.花萼。3—4.西藏报春 *Primula tibetica* Watt, 3.植株; 4.花萼。5.蕁麻叶报春 *Primula urticifolia* Maxim. (余峰绘)