

萼近等长；短花柱花：雄蕊着生处稍高于冠筒中部，花柱长约 3 毫米。蒴果长圆体状，与花萼近等长。 花期 6 月。

产于四川西部(新龙、道孚)。生长于草地和岩石上，海拔 4400—4800 米。模式标本采自道孚附近。

257. 西藏缺裂报春(中国高等植物图鉴)

Primula aliciae Taylor ex W. W. Smith in Journ. Linn. Soc. Bot. **52**: 336. 1942; W. W. Smith et Fletcher in Trans. Bot. Soc. Edinb. **33**: 461. 1943.

多年生草本，具粗短的根状茎和多数须根。叶丛基部通常具越冬枯叶；叶倒卵形至匙形，连柄长 2—4 厘米，宽 5—15 毫米，先端圆形，基部渐狭窄，具极短的翅柄，边缘具不整齐的三角形锐尖牙齿，上面遍布小伏毛，稍呈粗糙状，下面沿叶脉被小伏毛，被粉质腺体或淡黄色粉，中肋稍宽，侧脉 5—6 对，在下面显著。花萼高 6—18 厘米，顶端微被粉；伞形花序紧密，具 2—6 花；苞片狭披针形或倒披针形以至近线形，长 5—12 毫米，疏被粉，常有紫黑色线条；花梗长 1—5 毫米，多少被黄粉；花萼钟状，长 7—9 毫米，两面均被黄粉但内面被粉较密，分裂达中部或稍超过中部，裂片卵形至卵状矩圆形，具明显的中肋和侧脉，顶端圆形或钝，常具小齿；花冠淡紫色至深蓝紫色，冠筒口周围被粉，冠檐直径约 2 厘米，裂片阔倒卵形，先端具深凹缺；长花柱花：冠筒长 9—10 毫米，雄蕊距冠筒基部约 3.5 毫米着生，花柱长达冠筒口；短花柱花：冠筒长约 14 毫米，雄蕊着生于冠筒上部，花药顶端微露出筒口，花柱长约 3.5 毫米。蒴果长圆体状，长 7—8 毫米。 花期 7 月。

我国西藏特有种，模式标本采自米林。生长于多石的草坡上，海拔 4800 米。除模式标本外，尚无人再次采得。

258. 黄粉缺裂报春(中国高等植物图鉴) 石报春(拉汉种子植物名称) 图版 50: 1—4

Primula rupicola Balf. f. et Forr. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **9**: 41. 1915; W. W. Smith et Fletcher in Trans. Bot. Soc. Edinb. **33**: 467. 1943. 中国高等植物图鉴 **3**: 806. 1974; 云南种子植物名录 **2**: 1511. 1984. ——*Primula rupicola* Balf. f. et Forr. var. *albicolor* W. W. Smith et Fletcher in l.c. **33**: 468. 1943. syn. nov. ——*Primula yunnanensis* auct. non Franch.: Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. **9**: 284. 1939, p. p. quoad T. T. Yü 6456.

多年生草本，具粗短的根状茎和多数纤维状长根。叶丛基部常有残留的枯叶；叶片倒披针形至倒卵形或匙形，连柄长 1—10 厘米，宽 5—20 毫米，先端圆形或钝，基部渐狭窄，边缘具不整齐的牙齿，上面密被短伏毛，稍呈粗糙状，下面被淡黄色至白色粉或近于无粉，沿叶脉微被柔毛，中肋稍宽，侧脉 5—6 对，在下面稍明显；叶柄具狭翅，通常与叶片近等长。花萼高 2—12 厘米，多少被微柔毛，近顶端被粉；伞形花序疏松，具 2—8 花；苞片线状披针形，被微柔毛；花梗长 3—25 毫米，被淡黄色粉和微柔毛；花萼钟状或狭钟状，长 6—