

片有 1—2 对，位于裂片上部，生于上侧小脉中部以下；囊群盖圆肾形，近全缘，膜质，棕色，宿存。

特产台湾（阿里山）。

25. 红棕肋毛蕨（蕨类名词及名称）

Ctenitis aureo-vestita (Ros.) Ching in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. Ser. 8: 295. 1938. — *Dryopteris aureovestita* Ros. in Hedwigia 56: 343. 1915; C. Chr. Ind. Fil. Suppl. 2: 13. 1917; Hayata, Icon, Pl. Form. 8: 146. 1918.

植株高 25—30 厘米。根状茎短而直立，粗约 1 厘米，顶部密被鳞片；鳞片卵状披针形，长 5—6 毫米，先端长渐尖，全缘，膜质，红棕色。叶簇生；叶柄长 10—15 厘米，基部粗约 2.5 毫米，棕禾秆色，上面有浅沟，密被与根状茎上同样而开展的红棕色鳞片；叶片卵形，长 15—20 厘米，基部宽 8—12 厘米，先端长渐尖，基部浅心脏形，近三回羽状；羽片 8—10 对，下部 1—2 对对生，向上的互生，彼此接近，近平展，有短柄，基部一对与其上的形状相似但略较大，三角披针形，镰刀状，长 5—6 厘米，基部宽 4—4.5 厘米，先端渐尖，基部截形，近二回羽状；小羽片 8—10 对，互生，彼此密接，近平展，基部一对有短柄，向上的近无柄，椭圆披针形，基部下侧一片略为伸长，长 2.5—3 厘米，基部宽约 1 厘米，先端钝圆，基部截形，羽状；裂片 6—8 对，间隔 1—2 毫米，斜向上，椭圆形，长 6—7 毫米，基部宽 3—4 毫米，截头，基部下侧下延（基部一对近分离），边缘有疏浅齿。叶脉羽状，小脉 4—5 对，二叉或单一，斜向上，上面疏被有关节的棕色毛。叶近草质，干后褐棕色；叶轴及羽轴棕禾秆色，上面有纵沟并密被有关节的淡棕色毛，下面疏被与叶柄上同样而较小的红棕色鳞片。孢子囊群未见。

特产台湾（阿里山）。海拔 2 500 米。

日本学者伊藤洋曾认为本种与产于我国西南及华中和日本的阔鳞肋毛蕨 *Ctenitis maximowicziana* (Miq.) Ching 为同一种植物，但本种特产台湾，形体远较小，叶片下面无白色腺体，叶轴及羽轴的毛较疏并为红棕色，故为不同的两种植物。

26. 阔鳞肋毛蕨（中国高等植物图鉴） 白鳞肋毛蕨（台湾植物志） 图版 5: 1—4

Ctenitis maximowicziana (Miq.) Ching in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. Ser. 8: 294. 1938; H. Ito, Fil. Jap. Illustr. t. 267. 1944; Tagawa, Col. Illustr. Jap. Pterid. 106. pl. 40, f. 222. 1959; Icon. Corm. Sin. 1: 242, f. 484. 1972; De-Vol et Kuo in H. L. Li et al. Fl. Taiwan 1: 327. 1975; Fl. Fujian. 1: 215. 1982; J. L. Tsai et al. in Fl. Taiwan, sec. ed. 1: 283. 1994. — *Aspidium maximowiczianum* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 3: 178. 1867; Franch. et Sav. Enum. Pl. Jap. 2: 139. 1876; Bak. in Ann. Bot. 5: 314. 1891. — *Dryopteris maximowicziana* C. Chr. in Acta Hort. Gothob. 1: 63. 1924; Tagawa in Acta Phyto-