

小脉顶端，在主脉两侧各有1行；囊群盖圆盾形，全缘，膜质，棕色，宿存。

产贵州、云南（麻栗坡）。生林下，海拔1300—1600米。也产于越南北部。模式标本产地：贵州（Ta-ray）。

9. 掌状叉蕨（新拟）

Tectaria subpedata (Harr.) Ching in *Sinensia* 2 (2): 23, f. 4. 1931; C. Chr. Ind. Fil. Suppl. 3: 185. 1934; Tard.-Blot et C. Chr. in Lecomte, Not. Syst. 7: 91. 1938 et in Fl. Indo-Chine 7 (2): 407. 1941. — *Nephrodium subpedatum* Harr. in Journ. Linn. Soc. 16: 30. 1877. — *Aspidium subpedatum* Diels in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 1 (4): 186. 1899. — *Sagenia subpedata* Nakai in Bot. Mag. Tokyo 47: 167. 1933.

植株高30—45厘米。根状茎短横走至斜升，粗1—1.5厘米，顶部及叶柄基部均密被鳞片；鳞片披针形，长4—5毫米，先端长渐尖，全缘，膜质，褐棕色。叶簇生；叶柄长20—30厘米，基部粗约3毫米并为褐棕色，向上部禾秆色，疏被有关节的淡黄色长毛；叶片三角卵形，长15—20厘米，基部宽12—16厘米，基部浅心脏形，掌状三至五裂；顶生裂片椭圆披针形，长15—18厘米，中部宽5—7厘米，先端长渐尖，基部稍狭，全缘或有弯锯齿；第二对侧生裂片阔披针形，长8—9厘米，中部宽3—4厘米，先端长渐尖，基部不变狭，近全缘；基部一对侧生裂片镰状披针形，长5—6厘米，中部宽2—2.5厘米，先端长渐尖，基部下侧圆截形，全缘。叶脉联结成近六角形网眼，两面均稍隆起，上面偶被有关节的淡黄色长毛，下面密被同样的毛，有分叉的内藏小脉；羽轴及侧脉禾秆色，上面光滑，下面密被有关节的淡黄色长毛。叶纸质，干后暗绿色，上面光滑，下面密被有关节的淡黄色短毛。孢子囊群圆形，生于网眼的小脉上，在侧脉间有2行并接近侧脉；囊群盖圆盾形，膜质，棕色，全缘，宿存并略反卷。

产台湾、广西（龙州、百色、靖西）。生石灰岩上阴处。越南及缅甸也产之。模式标本产地：台湾（Fakow）。

10. 大叶叉蕨（新拟） 图版12: 1—2

Tectaria dubia (Bedd.) Ching in *Sinensia* 2 (2): 23, f. 5. 1931; C. Chr. Ind. Fil. Suppl. 3: 179. 1934; Tard.-Blot et C. Chr. in Lecomte, Not. Syst. 7: 92. 1938 et in Fl. Indo-Chine 7 (2): 414. 1941. — *Aspidium dubium* Bedd. Handb. Suppl. 47. 1892. — *Tectaria jinpingensis* Ching et C. H. Wang in Acta Phytotax. Sinica 19: 128. 1981.

植株高达2米。根状茎直立，粗壮，粗约3厘米，顶部及叶柄下部均密被鳞片；鳞片线状披针形，长8—10毫米，先端长渐尖，全缘，厚膜质，暗棕色。叶簇生；叶柄长达1米，基部粗1—1.5厘米，褐棕色至红棕色，上面有浅沟，疏被有关节的淡棕色短毛；叶片三角形，长与宽达1米，先端渐尖，基部浅心脏形，三回羽裂；羽片约6对，