

两面疏被棕色或褐色的星芒状小鳞片；能育叶柄较长，5—10 厘米，小鳞片较稀疏，叶片长椭圆形，长2.5—6 厘米，宽 1—2 厘米，孢子囊满布于能育叶的下面。

特产广西（瑶山、古陈、象县、金秀）及云南（麻栗坡、马关）。生潮湿岩石上或树干上，海拔 1 150—1 900 米。模式标本产地：广西（瑶山）。

2. 爪哇舌蕨（台湾植物志）

Elaphoglossum angulatum (Bl.) Moore, Ind. Fil. 5. 1857; C. Chr. Ind. Fil. 302. 1905; C. Chr. & Holtt. in Gard. Bull. 7: 290. 1934; Tagawa in Mem. Col. Sci. Univ. Kyoto Ser. B. 20: 28. 1951 et in Journ. Jap. Bot. 27 (7): 214. 1952 et in Acta Phytotax. Geobot. 23: 50. 1958; Cop. Fern Fl. Philip. 2: 278. 1960; DeVol & C. M. Kuo in H. L. Li et al., Fl. Taiwan 1: 353. 1975; C. M. Kuo in Taiwaniana 30: 36. 1985; J. L. Tsai et al. in Fl. Taiwan, sec. ed. 1: 358, photo 61. 1994. —*Acrostichum angulatum* Bl. Enum. Pl. Jav. 101. 1828 et Fl. Jav. 25, pl. 6. 1829. —*Elaphoglossum ogatai* C. Chr. in Dansk. Bot. Ark. 9 (3): 67. 1937; Ogata in Journ. Jap. Bot. 13 (2): 121. 1937 et Icon. Fil. Jap. 8: pl. 381. 1940.

根状茎细长而横走，单一或分枝，粗 3—5 毫米，密被鳞片；鳞片卵形，长 4—7 毫米，膜质，亮棕色，尖头，全缘或具疏睫毛。叶疏生，略呈二形：不育叶柄长 5—15 厘米（通常长 10—15 厘米），禾秆色，疏被鳞片，叶片披针形至椭圆披针形，略长于叶柄或与叶柄等长，宽 1.5—3 厘米，渐尖头，基部楔形，全缘，边缘平展且具薄的软骨质狭边，主脉明显，两面均隆起，并略被棕色小鳞片，侧脉不明显，二叉，直达叶边，叶革质，干后棕色；能育叶柄较长，达 20 厘米，叶片近似不育叶，但较狭较小，孢子囊沿侧脉着生，成熟时满布于叶片下面。

产台湾（阿里山、大武山）、海南（五指山）。生潮湿岩石上或树干的基部，海拔 1 600 米。也产于越南、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾及斯里兰卡。模式标本产地：印度尼西亚（爪哇）。

3. 吕宋舌蕨（新拟） 台湾舌蕨（台湾植物志）

Elaphoglossum luzonicum Cop. in Elmer. Leafl. Philip. Bot. 1: 235. 1907 et 2: 416. 1908 et Fern Fl. Philip. 2: 278. 1960; C. M. Kuo in Taiwaniana 30: 37. 1985. —*Elaphoglossum lepidopodum* C. Chr. ex Ogata in Journ. Jap. Bot. 13: 121. 1937 et Icon. Fil. Jap. 8: pl. 380. 1940; Tagawa in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto B. 20: 29. 1951; Pichi-Serm. Ind. Fil. Suppl. 4: 132. 1965; DeVol et C. M. Kuo in H. L. Li et al. Fl. Taiwan 1: 354. 1975; J. L. Tsai et al. in Fl. Taiwan, sec. ed. 1: 361. 1994.

根状茎斜升，粗约 4 毫米，与叶柄基部密被鳞片；鳞片卵状披针形，长约 5 毫米，

先端渐尖，边缘近全缘或具疏睫毛，棕色，有光泽，膜质。叶簇生，二形：不育叶柄长6—8厘米，禾秆色或暗棕色，基部以上略被与根状茎上相同但较小的鳞片，并疏被褐棕色的星芒状小鳞片，叶片椭圆披针形，长15—20厘米，中部宽2—3厘米，圆头，基部楔形或阔楔形，并下延于叶柄，全缘，有软骨质狭边，叶脉可见，主脉两面均隆起，上面有纵沟，侧脉二叉，直达叶边，叶厚革质，干后褐棕色，两面疏被褐色的星芒状小鳞片，通常在边缘软骨质狭边上的小鳞片较多；能育叶高于不育叶，柄长达15厘米，叶片与不育叶同形，但较小，长12—18厘米，中部宽1.5—2厘米，孢子囊满布于能育叶下面。

产台湾南部（高雄、台东）。也产于菲律宾及伊里安。模式标本产地：吕宋。

作者见到吕宋标本，但未见台湾标本，现仅依据台湾资料收录。

4. 琼崖舌蕨（中国蕨类植物图谱） 图版 26: 1—5

Elaphoglossum mcclurei Ching in Sinensia 1: 55. 1930 et Icon. Fil. Sinic. 2: pl. 82. 1934; C. Chr. Ind. Fil. Suppl. 3: 104. 1934; Ching et al. in Chun et al., Fl. Hainan. 1: 200, f. 98. 1964; Icon. Corm. Sin. 1: 279. 1972.

植株高20—30厘米。根状茎短而直立或斜升，粗约7毫米，与叶柄基部均密被鳞片；鳞片卵状披针形，渐尖头，边缘有疏睫毛，亮棕色或褐棕色，薄膜质。叶近生或簇生，二形：不育叶柄长4—7厘米，棕禾秆色，基部以上疏被与根状茎上同样的鳞片和褐色的星芒状小鳞片，叶片长椭圆披针形或狭舌形，长14—20厘米，宽2.5—4厘米，先端钝圆，基部楔形并下延于叶柄，边缘反卷，全缘而略呈波状，有软骨质狭边，主脉两面均略隆起，上面的纵沟不明显，侧脉不明显，通常在近基部处分叉，直达叶边，叶质坚硬，厚革质，干后棕色，两面均疏被褐色的星芒状小鳞片，老时擦落，下面有时还被分枝状毛；能育叶略高于不育叶，柄长11—17厘米，叶片与不育叶同形，长度近相等但远较狭，宽约1.5厘米，孢子囊沿侧脉着生，成熟时满布于能育叶下面。

特产海南（保亭、陵水、琼中）。通常生长于山地顶部，与苔藓植物一起附生于树干上，有时也生长在岩石上。模式标本产地：海南（红毛山）。

笔者认为属于本种的海南陵水 McClure 20066 号标本，Holttum [in Blumea 14 (2): 325. 1966] 认为应为 *E. spongophyllum* Bell.，笔者未见后者标本，不便加以评述。

5. 舌蕨 阿里山舌蕨（台湾植物志）

Elaphoglossum conforme (Sw.) Schott, Gen. Fil. pl. 14. 1834; Hayata, Icon. Pl. Form. 4: 257. 1914; Ogata, Icon. Fil. Jap. 8: pl. 379. 1940; H. Ito, Fil. Jap. Illustr. f. 439. 1944; DeVol et C. M. Kuo in H. L. Li et al. Fl. Taiwan 1: 354, pl. 124. 1975; Ching et al. in C. Y. Wu, Fl. Xizang. 1: 280. 1983; J. L. Tsai et al. in Fl. Taiwan, sec. ed. 1: 359, pl. 143. 1994. — *Acrostichum conforme* Sw. Syn. Fil. 10: 192, pl. 1, f. 1. 1806. — *Acrostichum marginatum*