


东北部、泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新几内亚岛及太平洋岛屿。模式标本采自印度尼西亚的爪哇岛。

2. 穴果棱脉蕨 图版 2: 3—4

Schellolepis subauriculata (Blume) J. Sm., Ferns Brit. et For. 82. 1866; Hist. Fil. 93. 1875 — *Polypodium subauriculatum* Blume, Enum. Pl. Jav. 133. 1828 et Fl. Jav. Fil. 177. t. 68. 1828; Hook., Sp. Fil. 5: 32. 1863; Hook. et Baker, Syn. Fil. 1: 344. 1867; C. B. Clarke in J. Soc. London Bot. 24: 417. 1888; Copel. In Philip. J. Sci. 2: 139. 1907; Hayata in Bot. Mag. Tokyo 23: 79. 1909; Ching in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 2 (3): 51. 1933; Tardieu. Et C. Chr. in Fl. Indo-Chine 7 (2): 538. 1941; Holttum, Rev. Fl. Mal. 2: 207. f. 108. 1955; Tagawa et Iwats., Fl. Thailand 3 (4): 573. 1989. — *Goniophlebium subauriculatum* (Blume) C. Presl, Tent. Pterid. 186. 1836; Bedd., Handb. 323. f. 173. 1883. — *Marginaria subauriculata* (Blume) Nakai ex Ito in J. Jap. Bot. 11: 95. 1935. — *Goniophlebium molle* Bedd., Ferns Brit. Ind. 2: 206. pl. 206. 1868 et Handb. 322. pl. 172. 1883; Satija et Bir, Polyp. Ferns Ind. 15. 1985. — *Polypodium beddomei* Baker in Hook. et Baker, Syn. Fil. (ed. 2) 344. 1883; C. Chr., Ind. Fil. 513. 1906; Ching in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 2: 50. 1933. — *Polypodiastrum molle* (Bedd.) Ching in Acta Phytotax. Sin. 16: 28. 1978.

附生植物。根状茎长而横走，粗约 6—8 毫米，密被鳞片，鳞片脱落处露出白粉；鳞片狭披针形，深棕色，顶端毛状，边缘有细齿。叶远生；叶柄长约 25—35 厘米，禾秆色或深禾秆色，除最基部被与根状茎上相同的鳞片外，向上光滑无毛；叶片一回羽状，披针形，长约 80—100 厘米，宽约 30—40 厘米；羽片约 30—40 对，下部近对生，上部互生，披针形，长约 14—20 厘米，宽约 2 厘米，基部心形，两侧或上侧耳状扩大并覆盖叶轴，顶端渐尖，边缘有粗锯齿。叶脉网状，中脉粗壮，侧脉和小脉纤细，在中脉两侧各具 2—3 行网眼。叶草质，干后黄绿色，叶轴和羽片中脉基部疏被棕色毛状小鳞片，叶片幼时疏被柔毛，老时近光滑。孢子囊群圆形，在羽片中脉两侧各 1 行，生于内侧网眼内的内藏小脉顶端。

产云南南部（景洪、勐腊）。附生树干上，海拔 500—1300 米。分布于越南、老挝、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新几内亚岛、澳大利亚东北部（昆士兰）及太平洋岛屿等。模式标本采自印度尼西亚的爪哇岛。



图版 2 1—2. 台湾水龙骨 *Polypodiodes formosana* (Baker) Ching: 1. 植株全形 (放大); 2. 羽片的一部分 (放大)。3—4. 穴果棱脉蕨 *Schellolepis subauriculata* (Blume) J. sm.: 3. 叶片的一部分, 示羽片基部无柄 (放大); 4. 根状茎上的鳞片 (放大)。5—6. 棱脉蕨 *Schellolepis persicifolia* (Desv.) Pic. Ser.: 5. 叶片的一部分, 示羽片基部有短柄; 6. 根状茎上的鳞片 (放大)。(蔡淑琴绘)