

色, 仅边缘 1—2 行细胞透明。叶簇生; 几无柄; 叶片似匙状或倒披针形, 长 3—7 厘米, 宽 4—6.4 毫米, 基部渐狭下延, 先端急尖头或钝圆头, 干后淡黄色或灰绿色, 纸质。主脉上下均隆起, 小脉不见。孢子囊群圆形, 通常聚生于叶片中部以上的先端, 位于主脉与叶边之间。

产江苏 (吴县、南京、句容)、安徽 (保华山和昆山)、浙江 (余杭、杭州、临安、淳安、建德、鄞县、舟山、开化、金华、遂昌、龙泉和乐清)、福建 (德化、崇安、南靖、福州)、江西 (庐山、武宁、奉新、广昌)、广东 (连平、大埔、乳源)、广西 (扶绥、横县、临桂、凌云、梧州、百色)、湖南 (黔阳、保靖、长沙、韶山)、四川 (南充、雅安)、重庆、贵州 (安顺)、云南 (昆明、绥江、永善)、西藏 (墨脱)。附生林下树干上或岩石缝中, 海拔 100—1600 米。模式标本采自浙江百华山。

10. 庐山瓦韦 (中国蕨类植物图谱) 图版 10: 5—7

Lepisorus lewissii (Baker) Ching in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. 4:65. 1933 et Ic. . Fil. Sin. 2:57. 1934; 傅书遐, 中国主要植物图说·蕨类植物门, 211. 图 280. 1957; Fl. Fujian 1: 229. 1982; 陈仁钧, 安徽植物志 1: 185. 图. 189. 1985; S. X. Xu in J. F. Cheng et G. F. Chu, Fl. Jiangxi 1:311. f. 318. 1993; Z. F. Zhang et S. Y. Zhang, Fl. Zhejiang 1: 313. f. 1—328. 1993; S. L. Yu et al. in Bull. Bot. Res. 16(1):11. 1996. — *Polypodium lewisii* Baker, J. Bot. 201. 1875; Christ, Farnkr. d. Erde 201. 1900; C. Chr., Ind. 535, 1905; Taketes, R. Bot. Gard. Edind. 8:275. 1915.


植株高约 9—15 厘米。根状茎细长横走, 密被披针形鳞片; 鳞片为深棕色, 不透明, 仅边缘 1—2 行网眼淡棕色, 透明, 具细齿。叶近生; 叶柄长 0.5—2 厘米或近无柄, 禾秆色; 叶片线形, 长 6—15 厘米, 宽 2—4 毫米, 顶部钝圆头, 基部略变狭并下延, 干后边缘强烈反卷包裹着孢子囊群而呈念珠状, 革质, 淡黄色。主脉上下均隆起, 小脉不见。孢子囊群椭圆形, 聚生于叶片上半部, 位于主脉和叶缘之间, 深陷于叶肉中, 幼时被隔丝覆盖; 隔丝棕色, 大网眼, 透明, 全缘。

产浙江 (临安、诸暨、宁海、开化、天台、遂昌、龙泉、庆元、云和、缙云、丽水、瑞安、文成和泰顺)、江西 (庐山、新建、上饶、井冈山、大余)、福建 (闽侯、建瓯、崇安)、安徽 (黄山、休宁、贵池、石台)、湖南 (余章)、四川 (泸定)、贵州 (榕江)、广西 (龙胜)、广东 (乳源)。附生林下或溪边岩石缝。海拔 280—1100 米。模式标本采自江西庐山。

11. 线叶瓦韦 (西藏植物志)

Lepisorus lineariformis Ching et S. K. Wu in C. Y. Wu, Fl. Xizang 1: 309. f. . 76: 1—4. 1983; R. J. Johns, Ind. Fil. Suppl. 197. 1976—1990; W. M. Chu et S. G. Lu in Li Heng, Fl. Dulongjiang Region 37. 1993.

植株高 10—20 厘米。根状茎横走, 密被披针形鳞片; 鳞片棕褐色, 中部有不透明



图版 10 1—2 阔叶瓦韦 *Lepisorus tosaensis* (Makino) Ching; 1. 植株全形; 2. 叶片部分放大。3—4. 百华山瓦韦 *Lepisorus paohuashanensis* Ching: 3. 植株全形; 4. 叶片部分放大。5—7. 庐山瓦韦 *Lepisorus lewisii* (Bak.)

Ching: 5. 植株全形; 6. 隔丝放大; 7. 叶柄基部鳞片放大。(冀朝棣绘)