

的黑带,边缘有2—3行近长方形透明的网眼,边上有细齿。叶近生;叶柄长0.5—1.5厘米,禾秆色;叶片线形,长10—20厘米,中部宽0.3—0.5厘米,长渐尖头,基部狭缩并下延,边缘平直或略反折,干后两面淡绿色。主脉上下均隆起,小脉不显。孢子囊群圆形,聚生于叶片上半部,位于主脉与叶边之间,彼此相距约等于1—1.5个孢子囊群体积,成熟时胀满主脉和叶边相隔的空间,幼时被隔丝覆盖;隔丝网眼近方形,透明,棕色,圆形。

特产西藏(墨脱的得儿工附近、地车斑固山、背崩地区、哈金)。附生于常绿阔叶林内树干或岩石上,海拔850—2200米。模式标本采自得儿工附近。

12. 狭叶瓦韦 (中国蕨类植物图谱)

Lepisorus angustus Ching in Bull. Fan Mem. Inst. Bilo. **4**: 86. 1933 et Ic. Fil. Sin. **2**: 73. 1934; Fl. Tsingling. **2**: 182. . 974; B. Z. Ding et al., Fl. Honan **1**: 103. 1981; 陈仁钧, 安徽植物志 **1**: 185. 1985; S. L. Yu et al. in Bull. Bot. Res. **16** (1): 12. 1996. — *Lepisorus pseudo-angustus* Ching in C. Y. Wu, Fl. Xizang. **1**: 310. 1983. — *Lepisorus nachuanensis* Ching et Z. Y. Liu in Bull. Bot. Res. **3** (4): 4. 1983. — *Lepisorus niger* Ching in C. Y. Wu, Fl. Xizang. **1**: 312. 1983.

植株高约12—25厘米。根状茎横走,密被披针形鳞片;鳞片中部不透明,棕色,边缘有1—2行狭长透明的网眼。叶近生;叶柄长约1.5—3厘米,禾秆色;叶片狭长披针形,中部宽3—5毫米,长10—22厘米,长渐尖头,向基部渐变狭并长下延,干后淡绿色或淡黄绿色至灰绿色,革质。主脉上下隆起,小脉不见。孢子囊群椭圆形或圆形,或短棒形,聚生于叶片上半部,位于主脉和叶边之间,幼时被深棕色近圆形的隔丝覆盖。

产浙江南部、安徽(休宁、歙县)、河南(伏牛山、卢氏)、湖南(永顺)、湖北(恩施、利川)、陕西(周至、华阴)、甘肃(文县、舟曲)、四川(里县、南川、丹巴、南坪、芦山、保兴、雷波、泸定、雅安、甘洛)、广西(金县)、云南(维西、漾濞、大理、鹤庆、中甸、大姚)、西藏(定结、林芝、波密、察隅)。附生于林下树干或岩石上,海拔900—3500米。模式标本采自四川。

13. 异叶瓦韦 (新拟) 及瓦韦 (中国蕨类植物图谱), 拟及瓦韦 (台湾植物志)

Lepisorus heterolepis (Rosenst.) Ching in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. **4**: 86. 1933 et Ic. Fil. Sin. **2**: 72. 1934; Tagawa et k. Iwats., Fl. Tailand **3** (4): 514. f. **51**: 1. 1989. — *Polypodium lineare* var. *heterolepis* Rosenst. in Fedde, Repert. **12**: 247. 1913. — *Polypodium loriformis* var. *heterolepis* C. Chr. Contr. U. S. Nat. Herb. **26**: 318. 1931. — *Polypodium lineare* var. *monilisorum* Hayata, Ic. Form. **4**: 248. f. 173. 1914. — *Lepisorus monilisorum* (Hayata) Tagawa in Acta Geob. **11**: 302. 1942; Shieh, De Vol et C. M. Kuo, Fl. Taiwan 2nd ed. **1**: 491. 1994.

植株高15—30厘米。根状茎横走,密被披针形鳞片;鳞片中部不透明,褐色,边