

18. 粤瓦韦 (中国蕨类植物图谱)

Lepisorus obscure-venulosus (Hayata) Ching in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. **4**: 76. 1933 et Ic. Fil. Sin. **2**: 66. 1934; Tardieu et C. Chr., Fl. Indo-Chine **7** (2): 457. 1939; 傅书遐, 中国主要植物图说·蕨类植物门 214 图 248. 1957; Ching et al. in W. Y. Chun, Fl. Hainan. **1**: 171. f. 79. 1964; Ic. Corm. Sin. **1**: 254. 1972; Y. L. Zhang et al., Sporae Pterid. Sin. 355. t. 78. f. 8—11. 1976; De Vol et C. M. Kuo in H. L. Li et al., Fl. Taiwan **1**: 187. 1975; 陈仁钧, 安徽植物志 **1**: 188. 图. 192. 1985; Fl. Fujian **1**: 229. f. 216. 1982; S. X. Xu in J. F. Cheng et G. F. Chu, Fl. Jiangxi **1**: 311. f. 319. 1993; Z. F. Zhang et S. Y. Zhang, Fl. Zhejiang **1**: 316. f. 332. 1993; Shieh, De Vol et C. M. Kuo, Fl. Taiwan 2nd ed. **1**: 492. photo. 72. 1994; S. L. Yu et al. in Bull. Bot. Res. **16** (1): 16. 1996. — *Polypodium obscure-venulosus* Hayata, Ic. Pl. Form. **5**: 322. 1915; C. Chr., Ind. Sup. 27. 1913—1916; Ogata, Ic. Fil. Jap. 3. pl. 141. 1930.

植株高 10—25 (30) 厘米。根状茎横走, 密被阔披针形鳞片; 鳞片网眼大部分透明, 只有中部一条褐色不透明的狭带, 全缘。叶通常远生; 叶柄长 1—5 (7) 厘米, 通常褐栗色或禾秆色; 叶片披针形或阔披针形, 通常在下部 1/3 处为最宽, 约 1—3.5 厘米, 先端长尾状, 向基部渐变狭并下延, 长 12—25 (30) 厘米, 干后淡绿色或淡黄绿色, 近革质, 下面沿主脉有稀疏的鳞片贴生。主脉上下均隆起, 小脉不见。孢子囊群圆形, 体大, 直径达 5 毫米, 成熟后扩展, 彼此近密接, 幼时被中央褐色圆形隔丝覆盖。

产台湾 (宜兰、桃园、新竹、台中、南投、高雄、屏东、台东、花莲)、福建 (连城、德化、建阳、崇安)、浙江 (临安、淳安、江山、遂昌、松阳、龙泉、庆元、缙云、丽水、瑞安、泰顺)、安徽 (休宁、盐田)、江西 (庐山、玉山、铅山、井冈山、遂川、石城、寻乌)、广东 (乳源、仁化、连南、乐昌、翁源)、广西 (龙胜、武鸣、凤山、大苗山、临桂、平南、贺县、百色)、湖南 (洞口、新宁、江永、衡山、武岗、宜章)、四川 (南川)、重庆 (缙云山)、贵州 (安龙、梵净山、江口、雷山、凯里)、云南 (麻栗坡、新平、马关、西畴、屏边)。附生林下树干或岩石上, 海拔 400—1700 米。日本也产。模式标本采自我国台湾。

19. 聂拉木瓦韦 (西藏植物志)

Lepisorus nylamensis Ching et S. K. Wu in C. Y. Wu, Fl. Xizang. **1**: 311. f. 76: 8—12. 1983; R. J. Johns, Ind. Fil. Suppl. **6**: 198. 1976—1990; S. L. Yu et al. in Bull. Bot. Res. **16** (1): 17. 1996.

植株高 12—25 厘米。根状茎横走, 密被卵圆状披针形鳞片; 鳞片中部有不透明的狭带。叶近生; 叶柄长 1—1.5 厘米, 禾秆色; 叶片狭披针形, 中部最宽约 0.7—1 厘米, 有较长尾状先端, 向基部渐变狭并下延, 长 1—22 厘米, 干后, 淡黄色, 薄革质。主脉上下均隆