

产四川（筠连）、贵州（兴义）、云南（维西、镇康、贡山、景洪、西畴、景东、漾濞）。附生林下树干和岩石上，海拔 1500—2900 米。

11. 尖嘴蕨属 *Belvisia* Mirbel

Mirbel in Hist. Nat. Veg. 5: 111. 1803; Copel., Gen. Fil. 5: 191. 1947; 傅书遐, 中国蕨类植物志属 159. 1954; Holttum, Rev. Fl. Mal. 2: 153. 1955; Ching in Acta Phytotax. Sin. 16 (3): 17. 1978; S. H. Wu et Ching, Fern Fam. et Gen. China 515. f. 5—197. 1991. —*Hymenolepis* Kaulf. Enum. 146. 1824, auct. non Cassin 1817; C. Chr. Dansk Bot. Archiv. 6 (3): 142. 1929. —*Macroplethus* C. Presl, Epim. Bot. 54. 1849.

中等附生蕨类。根状茎短而横卧，或长而横走，通常密被须根，疏被鳞片；鳞片褐色，披针形，长渐尖头，边缘具粗长刺，细长筛孔，质厚，或膜质而呈淡棕色，披针形，大型多边形筛孔，边缘具细齿。叶近簇生或近生，单叶；叶柄短，以关节着生于根状茎上；叶片通常为披针形或长圆披针形，全缘，顶部急剧狭缩为线形，草质至革质，光滑。主脉通常明显，小脉网状，有内藏小脉，末端有水囊。孢子囊群线形，仅生于叶片先端狭缩部分，在主脉两侧各成一条，幼时被隔丝覆盖，成熟时遍布狭缩部分下面。孢子椭圆形，不具周壁，外壁轮廓线凹凸不平，或小的波纹状，正面观呈瘤块状纹饰。染色体基数 $x=7$ (35?)。

模式种：*Belvisia spicata* (L.) Mirbel (*Acrostichum spicatum* L.) 产非洲及邻近岛屿。

全属约有 15 种，从非洲至波利尼西亚。中国有以下 3 种。

分 种 检 索 表

1. 叶片狭长披针形，上半部渐变狭至收缩成线形，干后草质 1. 尖嘴蕨 *B. mucronata* (Fee) Copel.
1. 叶片卵状披针形，或椭圆形，上部突然急剧收缩成线形，干后纸质或革质。
 2. 叶仅具短柄或几无柄，叶片边缘波状 2. 隐柄尖嘴蕨 *B. henryi* (Hieron) Tagawa
 2. 叶具 0.2—2 厘米的短柄，叶片边缘全缘 3. 显柄尖嘴蕨 *B. annamensis* (C. Chr.) Tagawa

1. 尖嘴蕨（中国蕨类植物志属） 图版 20: 1—8

Belvisia mucronata (Fee) Copel., Gen. Fil. 912. 1947; 傅书遐, 中国蕨类植物志属