

变狭，楔形，沿主脉下面有一二鳞片，干后纸质，绿色。主脉两面隆起，小脉略可见。孢子囊群小，星散分布于叶片下面，近叶边不育。

产广西北部（龙胜、花坪）。攀援林下岩石上，海拔 400—1100 米。

6. 阔基鳞果星蕨（蕨类名词名称）

Lepidomicrosorium latibasis Ching et Shing in Bot. Res. 1: 6. pl. 3: 3. 1983. ——

Lepidomicrosorium yiliangense Ching et Shing in Bot. Res. 1: 7. pl. 3: 4. 1983. ——

Lepidomicrosorium emeicola Ching et Shing in Bot. Res. 1: 7. 1983.

植株高 16—28 厘米。根状茎长而攀援，粗 1—2 毫米，密被棕色披针形鳞片。叶疏生；叶柄长 5—15 厘米，粗 1—1.2 厘米，禾秆色。叶片卵状披针形，或长圆披针形，长 10—18 厘米，中部以下宽 2.7—4.5 厘米，短渐尖头，基部阔楔形或圆楔形，以狭翅下延，全缘，干后纸质，灰绿色。主脉两面隆起，小脉明显。孢子囊群小，星散分布于叶片下面。

产湖北（合丰、芹菜坪）、四川（峨眉山的清音阁、雅安、大相岭）、贵州（毕节）、云南东北部（彝良的朝天马林场）。攀援于林下树干上，海拔 1190—1900 米。

7. 四川鳞果星蕨（蕨类名词名称）

Lepidomicrosorium sichuanense Ching et Shing in Bot. Res. 1: 8. pl. 4: 1. 1983.

植株高达 28 厘米。根状茎长而攀援，粗约 2.5 毫米，密被红棕色披针形鳞片。叶疏生；叶柄长达 8 厘米，粗 1.2 毫米，禾秆色；叶片披针形，长 18 厘米，长渐尖头，基部变宽，2.5—3.5 厘米，稍浅裂，近圆楔形，以狭翅下延，边缘略呈波状，干后纸质，淡绿色。主脉两面隆起，小脉下面可见。孢子囊群中等大，星散地密布于叶片下面。

产四川（宝兴、奉节）。攀援于岩石上。海拔 1150 米。

8. 披针鳞果星蕨（蕨类名词名称）

Lepidomicrosorium lanceolatum Ching et P. S. Wang in Bot. Res. 1: 8. 1983.

植株高约 10 厘米。根状茎长而攀援，粗约 1.5 毫米，密被红棕色披针形鳞片。叶疏生，近二型；能育叶柄长约 1 厘米，披针形，长达 9 厘米，基部变宽，阔楔形，渐尖头，全缘；不育叶片通常较短，基部较宽，圆楔形，柄长 3—4 厘米，干后厚纸质，暗绿色。主脉两面隆起，小脉不显。孢子囊群小，散生，而在较小的能育叶上则在主脉两侧各排成一行，形如瓦韦。

产贵州（安顺、息烽）。攀援树干上，海拔 1430 米。

9. 近无柄鳞果星蕨（蕨类名词名称）

Lepidomicrosorium subsessile Ching et Shing in Bot. Res. 1: 6. pl. 3: 2. 1983.

植株高 14—18 厘米。根状茎长而攀援，粗约 3 毫米，密被红棕色披针形鳞片。叶散生，近二型；叶柄极短或几无柄；能育叶狭披针形，长 12—18 厘米，中部宽 1.2—

1.5 厘米，渐尖头，基部楔形，以狭翅长下延几达叶柄着生处；不育叶片较短而阔，长 10—12 厘米，下部最宽 2—2.3 厘米，基部斜切成楔形并下延，全缘，干后厚纸质，灰绿色。主脉两面均隆起，小脉不显。孢子囊群小，星散分布于主脉两侧，幼时被盾状隔丝覆盖。

产四川（峨眉山、雷波）。生林中攀援树干上，海拔 900—1800 米。

10. 老君鳞果星蕨（蕨类名词名称）

Lepidomicrosorium laojunense Ching et Shing in Bot. Res. 1: 10. pl. 4: 4. 1983.

植株高达 34 厘米。根状茎长而攀援，粗约 3 毫米，密被褐棕色披针形鳞片。叶疏生；叶柄长达 5 厘米，褐棕色；叶片狭披针形，长达 30 厘米，宽 2.3 厘米，渐尖头，基部狭楔形，长下延，沿主脉下面偶有一二小鳞片，干后薄纸质。孢子囊群中等大，紧靠主脉两侧星散分布，向外有不育的阔叶边。

产云南（文山、老君山的葛蒲塘）。海拔 2000 米。

11. 南川鳞果星蕨（蕨类名词名称）

Lepidomicrosorium nanchuanense Ching et Z. Y. Liu in Bull. Bot. Res. 4 (4): 27. pl. 58. 1984.

植株高达 38 厘米。根状茎长而攀援，粗约 2.4 毫米，密被深棕色卵状披针形鳞片。叶疏生；叶柄长 2—3 厘米；叶片长圆披针形，长约 35 厘米，中部宽 2.1—2.5 厘米，渐尖头，基部楔形，长下延，全缘，干后革质，绿色。主脉两面均隆起，小脉不显。孢子囊群小，星散分布于主脉两侧，幼时被盾状隔丝覆盖。

产四川东南部（南川的金佛山）。攀援树干上，海拔 1600 米。

12. 小果鳞果星蕨（蕨类名词名称）

Lepidomicrosorium microsorioides (W. M. Chu) Ching et W. M. Chu in Bot. Res. 1: 7. 1983. ——*Neolepisorus microsorioides* W. M. Chu in Acta Bot. Yun. 1 (2): 96. pl. 3. 1979.

植株高 35—42 厘米。根状茎长而攀援，密被褐棕色披针形鳞片。叶远生；叶柄长 10—12 厘米，粗 1—2 毫米，灰褐色，光滑；叶片披针形，长 25—30 厘米，中部以下宽 4—4.5 厘米，渐尖头，基部圆楔形，略下延，全缘，干后近革质，黄绿色。主脉两面隆起，侧脉略可见，小脉不显。孢子囊群小，圆形或长圆形，在主脉两侧不规则地排成 1—4 行，幼时被盾状隔丝覆盖。

产云南东北部（绥江的二十四岗）。生林下攀援溪边岩石上，海拔 1400 米。

13. 尾叶鳞果星蕨（蕨类名词名称）

Lepidomicrosorium caudifrons Ching et M. W. Chu in Bot. Res. 1: 10. pl. 1. 1983.

植株高达 44 厘米。根状茎细长，疏被深棕色披针形鳞片。叶散生；叶柄长达 15 厘米，粗 1.5 毫米，褐棕色，上部有狭翅，光滑；叶片披针形，长约 33 厘米，中部宽