

gracillimus Copel. in Perkins Fragm. 189. 1905; Hayata, Icon. Pl. Formosa **4**: 248. 1914. — *Calymmodon gracillimus* (Copel.) Nakai ex H. Ito in J. Jap. Bot. **11**: 88. 1935; De Vol in H. L. Li et al., Fl. Taiwan **1**: 216. 1975. — *Calymmodon glabrescens* auct. non Copel.: Shimizu in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa **28**: 242, f. 3. 1938.

小形植物，高3—10厘米。根状茎直立，有少数鳞片，鳞片厚膜质，披针形，长2毫米，宽约0.7毫米，先端常有一根刚毛或无。叶多数，簇生，枯死后常留有黑褐色的叶轴；叶近无柄，叶片厚纸质，下面有一、二灰白色细毛，上面无毛，条形，长1.5—3.5厘米，宽达5毫米，向两端略变狭，基部下延，羽状深裂几达羽轴，缺刻宽；裂片彼此远分开，中部以下的不育，较长，短条形或矩圆形，长1—2.5毫米，宽约0.7毫米，全缘，仅有小脉1条，远离叶边，上部2—7对裂片能育，阔椭圆形或近圆形，幼时在下面从下向上对折包被孢子囊群。孢子囊群生于裂片主脉中部，近圆形，每裂片1枚。孢子囊上无刚毛。

产海南（吊罗山）、广西（上思）。附生林中树干或溪边岩石上，常和苔藓混生，海拔400—1000米。越南、泰国、菲律宾也有分布，模式标本采自越南。

本种同 *Calymmodon curtus* Parris 的关系有待进一步研究，从植株形态和鳞片先端具毛的情况，两者极可能是同一物种。在我国本种一直被鉴定为 *Calymmodon cucullatus* (Nees et Blume) C. Presl，但后者是一个植株各部分相对较大的种类。

2. 疏毛荷包蕨（台湾植物志）

Calymmodon gracilis (Fee) Copel. in Philipp. J. Sci. **34**: 266. 1927; De Vol in H. L. Li et al., Fl. Taiwan **1**: 217, pl. 76. 1975. — *Plectopteris gracilis* Fee, Gen. Fil. **230**. 1852. — *Calymmodon hyalinus* auct. non Copel.: Shimizu in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa **28**: 243, f. 4. 1938.

叶簇生，基部收缩，无柄或有极短的柄；叶片为狭窄的长椭圆形，长3—8厘米，宽5—6毫米；裂片彼此接近，宽大于裂片之间的间隔；被有较多的棕色软毛，毛长1—2毫米。孢子囊群椭圆形，裂片下边向上反折，几乎完全覆盖幼孢子囊群。

产台湾（台北、屏东、台东）。越南、菲律宾、马来西亚和加里曼丹岛均有分布。

2. 锯蕨属 *Micropolypodium* Hayata

in Bot. Mag. [Tokyo] **42**: 341. 1928; A. R. Smith in Novon **2**: 419. 1992. — *Xiphopteris* Kaulf. in Berl. Jahrb. Pharm. **21**: 35. 1820. pro parte; Copel., Gen. Fil. **214**. 1947. pro parte; De Vol in H. L. Li et al., Fl. Taiwan **1**: 227. 1975. pro parte — *Micropteris* Desv.,