

尖,全缘。叶簇生;叶柄长3—5毫米,或近无柄,无毛或疏被半透明的叉状长毛;叶片线形,长3—10厘米,宽4—6毫米,顶端钝,基部渐狭而长下延,几达叶柄基部,羽状深裂几达中肋;裂片8—10(—20)对,互生,斜向上,三角形或三角状长圆形,长2—3毫米,基部宽1—2毫米,顶端钝或尖,边缘或上侧稍呈波状或有一小齿;中肋明显,上面有浅沟,下面隆起,侧脉不明显,每裂片有1条,通常二叉,顶端膨大成椭圆形、半透明的水囊体;叶近革质,除下面中肋疏被白色、半透明的叉状长毛外,其余均无毛。孢子囊群圆形,着生于裂片基部下侧分叉小脉顶端,斜向上,每裂片有1个,靠近中肋两侧各排成1行。

产浙江(龙泉)、福建(德化、上杭、崇安)、广东(信宜、增城)、广西(龙胜)。斯里兰卡(模式产地)也有分布。附生于林中树干上。


2. 锯蕨 (中国主要植物图说·蕨类植物门) 图版 70: 1—6

Micropolypodium okuboi (Yatabe) Hayata in Bot. Mag. [Tokyo] **42**: 302, 341. 1928; A. R. Smith in Novon **2**: 420, f. 1: A. 1992. — *Polypodium okuboi* Yatabe in Bot. Mag. [Tokyo] **5**: 35, t. 21. 1891. — *Grammitis okuboi* (Yatabe) Ching in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. **10**: 16. 1940; 傅书遐, 中国主要植物图说·蕨类植物门 249, 图. 335. 1957; C. M. Kuo in Taiwan **30**: 44. 1985; C. F. Zhang et S. Y. Zhang, Fl. Zhejiang **1**: 330, f. 1—351. 1993. — *Xiphopteris okuboi* (Yatabe) Copel., Gen. Fil. **215**. 1947; De Vol in H. L. Li et al., Fl. Taiwan **1**: 227, pl. 81. 1975; Shieh et al., Fl. Taiwan 2nd ed. **1**: 532, pl. 207. 1994. — *Polypodium pseudotrichomanoides* Hayata, Icon. Pl. Formosa **4**: 251, f. 176. 1914; T. Ito, Ill. Formosa Ferns pl. 370. 1928. — *Micropolypodium pseudotrichomanoides* (Hayata) Hayata in Bot. Mag. [Tokyo] **42**: 341. 1928; Ogata, Icon. Fl. Jap. **4**: pl. 191. 1931.

根状茎短而直立,被鳞片;鳞片棕色,近膜质,披针形,顶端渐尖,全缘。叶簇生;叶柄极短,长不及1厘米,或几无柄,疏被暗棕色长刚毛;叶片线形,长3—7厘米,宽4—6毫米,顶端锐尖,基部渐狭而下延,羽状深裂几达中肋;裂片多数,互生近平展,长圆形或卵状长圆形至长三角形,有时稍呈镰刀状,长约3毫米,顶端钝或锐尖,全缘;中肋明显,上面有浅沟,下面隆起,侧脉不明显,通常每裂片上有1条,单一或分叉,顶端具1—2个水囊体;叶近革质,稍厚,两面被暗棕色长刚毛。孢子囊群圆形至椭圆形,着生于裂片基部下侧分叉小脉的顶端,通常每裂片有1个,贴近中肋两侧各排成1行。

产浙江(龙泉)、湖南(宜章)、福建(崇安)、海南、台湾、广东(信宜)、广西(龙胜)、贵州(雷公山)。日本南部(模式产地)也有。附生于林中树干上,同苔藓植物混生,海拔1100—1900米。

3. 锡金锯蕨 (新拟) 图版 71: 1—3



图版 70 1—6. 锯蕨 *Micropolypodium okuboi* (Yatabe) Hayata: 1. 植株 (全形); 2. 叶片一段 (放大); 3. 孢子囊 (放大); 4, 5. 鳞片 (放大); 6. 叶面上的毛 (放大)。(冀朝桢绘)