

植物的特征。

1. 革舌蕨 (台湾植物志) 图版 76: 1—5

Scleroglossum pusillum (Blume) Alderw. in Bull. Jard. Bot. Buit. **2** (7): 39, pl. 5, f. 1—2. 1912; C. Chr. in Dansk Bot. Ark. **6** (3): 27. 1929; Tardieu et C. Chr. Fl. Indo-Chine **7** (2): 524, f. 39: 4—5. 1941; Holttum, Fl. Mal. **2**: 234, f. 135. 1954; De Vol in H. L. Li et al., Fl. Taiwan **1**: 227, pl. 80. 1975; Tagawa et K. Iwats., Fl. Thailand **3** (4): 598, f. 59: 8—9. 1989; Shieh et al., Fl. Taiwan 2nd. ed. **1**: 532, pl. 206. 1994; S. G. Lu et G. F. Zhang in Acta Bot. Yun. **16** (3): 241. 1994. — *Vittaria pusilla* Blume, Enum. Pl. Java 199. 1828. — *Taenitis pusilla* Mett. in Ann. Mus. Ludg. Nat. **4**: 172, pl. 4, f. 11. 1869. — *Pleurogramme pusilla* Christ in Philipp. J. Sci. II C: 175. 1907.

根状茎斜升，鳞片披针形，长约6毫米，暗褐色，膜质，上部狭窄。叶簇生，近无柄，线状舌形，通直或稍呈镰刀状，长2—12厘米，宽3—4毫米，顶端钝或圆，下部渐狭，全缘，单叶或偶呈分叉；主脉下面下部稍明显，上面有浅沟；小脉不明显，分离，偏斜，分叉；叶厚革质，坚硬，叶下面及边缘稀疏散生有星状毛。孢子囊群深藏于稍近叶缘的沟中，只在叶片上部的1/3—1/2能育，叶缘不育部份的宽度约为中央不育部份的一半。

产台湾（台北）、海南（通什五指山）、云南（麻栗坡老君山）、广西（武鸣大明山）。斯里兰卡、泰国、越南、菲律宾、马来西亚和印度尼西亚也有。模式产地爪哇。

[存疑] 鼓蕨属 *Acrosorus* Copel.

Copel. in Philipp. J. Sci. **1**, Suppl. 158. 1906; Copel., Gen. Fil. **216**. 1947; Ching in Acta Phytotax. Sin. **16** (3): 18. 1978; Parris in Kramer et Green, Fam. et Gen. Vasc. Pl. I, Pterid. et Gymn. **156**, f. 82A, B. 1990; S. H. Wu et Ching, Fern Fam. et Gen. China **554**. 1991.

附生，中型。根状茎短，直立或斜升，密被全缘、棕色至褐色的线形鳞片。叶簇生，无柄或近无柄，叶柄无关节，叶片狭长，线形，近一回羽状，裂片为偏斜的三角形，以阔的基部彼此相连，每裂片具有单一或分叉的小脉。叶革质，被单一，分枝或星状的短毛。孢子囊群单生于小脉顶端，位于裂片下面的顶部，每裂片1枚，裂片顶部的两侧边反折并互相相会而包着孢子囊群，当孢子囊群成熟时则被推开，无隔丝；孢子囊的环带由12个增厚细胞组成。孢子球形或近球形。

属模式：*Acrosorus exaltatus* Copel.，原产菲律宾。

约 7 种，分布自东南亚至波利尼西亚。Ching (1978) 记载我国有该属，S. H. Wu et Ching (1991) 认为中国有 1 种鼓蕨属植物。由于没有见到中国产本属的任何植物标本，暂存疑，志此，备查。