

3. 拟小石松属 *Pseudolycopodiella* Holub

Holub in Folia Geobot. Phytotax. **18**: 441. 1983; B. Ollg. Index Lycop. **81**. 1989; L. B. Zhang et H. S. Kung in Acta Phytotax. Sin. **38** (3): 270. 2000.

多年生沼地或湿地生植物。主茎匍匐状；主茎上的叶片螺旋状排列，二型，侧面的叶片贴生，比中间的叶片大。孢子枝单生，直立，仅具稀疏的鳞片状叶片；孢子叶短于孢子枝上的叶片；苞片疏生，钻形至披针形。孢子囊穗单生，圆柱形。孢子叶一种形状，即阔卵形，覆瓦状排列，顶端急尖，边缘膜质，具不规则钝齿；孢子囊生于孢子叶腋，内藏，圆肾形，黄色。

属的模式：*Pseudolycopodiella caroliniana* (L.) Holub (= *Lycopodium carolinianum* L.)

这是个近年来才提出的新属，考虑到其形态特征确实有别于 *Lycopodiella*，我们在此予以承认。

全属约 10—15 种，主产美洲及其他热带地区。我国 1 种，湖南、广东、福建等省分布。

卡罗利拟小石松 (植物分类学报)

Pseudolycopodiella caroliniana (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. **18**: 442. 1983; B. Ollg., Index Lycop. **81**. 1989; Nakaike, N. Fl. Jap. Pterid. rev. enlarg. 791. 1992; L. B. Zhang et H. S. Kung in Acta Phytotax. Sin. **38** (3): 270. 2000. — *Lycopodium carolinianum* L., Sp. Pl. 1101. 1753; Lam., Ency. Bot. **3**: 649. 1789; Sprengel, Syst. Veg. **4**: 13. 1827; Grev. et Hook. in Bot. Misc. **2**: 378. 1831; Baker, Handb. Fern Allies **28**. 1887; Alderw, Malay. Fern-allies **50**. 1915; Nessel, Baerlappge. **270**. 1939; Tagawa, Coll. Ill. Jap. Pterid. **14**, pl. 3: **18**. 1959; Fl. Fukien **1**: 6—7. 1982; Nakaike, N. Fl. Jap. Pterid. **13**. f. 13a—b. 1982; Jacobsen, Ferns Fern Allies S. Africa **138**, f. 81. 1983; Fl. Fujian rev. **1**: 6. 1991; K. Iwats., Ferns Fern Allies Jap. **48**. pl. 6: **5**. 1992. — *Lepidotis caroliniana* (L.) P. Beauv. in Mag. Enc. **5**: 478. 1804, et in Prod. Aeth. **108**. 1805; Rothm. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **54**: 66. 1944. — *Lycopodiella caroliniana* (L.) Pic. Ser. in Webbia **23**: 165. 1968; B. Ollg. in Opera Bot. **92**: 175. 1987, et l. c. **25**. — *Lycopodiella caroliniana* (L.) Holub: Ching in Acta Bot. Yunnan. **4** (3): 215. 1982. — *L. repens* P. Beauv. in Prod. Aeth. **109**. 1805. — *L. subinundatum* Tagawa in Acta Phytotax. Geobot. **10**: 75. 1941.

多年生沼地或湿地生植物。主茎匍匐状，长 10—30 厘米，二叉分枝，直径 2—5 毫