

状至近于球形，纸质，棕色，向裂片边缘开口。

产台湾（屏东、台东）。生于林中，海拔 600—2500 米。菲律宾和加里曼丹岛的北部也有分布。模式标本采自菲律宾。

4. 阴生桫欏（植物分类学报） 图版 77: 5—7


Alsophila latebrosa Wall. ex Hook., Sp. Fil. 1: 37, 1844; Bedd., Handb. Ferns Brit. India, 11. 1883, p. p.; Alderw., Handb. Mal. Ferns, 38: 789. 1908, p. p.; Q. Xia in Acta Phytotax. Sin. 27 (1): 8. 1989. — *Dichorexia latebrosa* (Hook). Presl in Abh. Bohm. Ges. Wiss. 5: 344. 1848. — *Hemitelia latebrosa* (Hook.) Mett., Fil. Hort. Lips. 11. 1856, et in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 1: 54. 1863, p. p.; Alderw., Handb. Mal. Ferns suppl. 51. 1917, p. p. — *Cyathea latebrosa* (Hook.) Copel. in Philipp. J. Sci. Bot. 4: 52. 1909; Holttum in Gard. Bull. Str. Settl. 8: 303, t. 29. 1935, p. p.; Tardieu et C. Chr. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 7 (2): 85. 1939, p. p.; Holttum in Rev. Fl. Mal. 2: 120, f. 48. 1954, p. p.; Ching et Chu H. Wang in Acta Phytotax. Sin. 8: 147. 1959; Holttum in Van Steenis, Fl. Mal. ser. 2 (1): 115. 1963, et in Kew Bull. 19: 472. 1965. — *C. tsangii* Ching et S. H. Wu in Acta Phytotax. Sin. 9: 366. 1964; Fl. Hainan. 1: 140. 1964; Sylva Sinica 1: 141, f. 1: 5—7. 1983. — *C. contaminans* sensu Merr. in Lingn. Sci. J. 5: 8. 1927, non Copel. 1909.

茎干高达 5 米，直径约 8 厘米。叶柄褐禾秆色至淡棕色，长约 30 厘米，下面密生小疣突；叶片三回羽状深裂；羽片稍斜展，柄长约 5 毫米，宽披针形，长达 50 厘米，中部宽约 14 厘米，顶端长渐尖；小羽片约 25 对，近平展，有短柄，相距约 1.5—2 厘米，条形，长 6—7 厘米，基部宽约 1.5 厘米，顶端长渐尖，基部截形而略不对称，深羽裂近小羽轴，裂片 16—20 对，主脉相距约 3—4 毫米，条状披针形，长 6—8 毫米，基部稍宽，钝头，边缘有浅圆齿；叶脉下面略可见，侧脉通常 2 叉；叶为纸质，干后上面深褐色，下面灰绿色，两面均无毛；叶轴褐禾秆色，下面有小疣突，羽轴下面粗糙，小羽轴上面密被棕色毛。孢子囊群近主脉着生，囊群盖鳞片状，着生于囊托基部近主脉一侧，成熟时通常被孢子囊群覆盖，隔丝较孢子囊长。

产海南（琼海至儋州、琼中、临高至澄迈、白沙、昌江、保亭、陵水）、云南（河口）。生于林下溪边阴湿处，海拔 350—1000 米。马来半岛、苏门答腊、加里曼丹、泰国和柬埔寨也有分布。模式标本采自槟榔屿。

5. 兰屿桫欏（台湾植物志）

Alsophila fenicis (Copel.) C. Chr., Ind. Fil. Suppl. 5. 1913; Liao in Mem. Agr. Nat. Taiwan Univ. 10 (2): 34, 36. 1969; De Vol in Li et al., Fl. Taiwan. 1: 135. 1975; Q. Xia in Acta Phytotax. Sin. 27 (1): 9. 1989. — *Cyathea fenicis* Copel. in Philipp. J. Sci. 3: 354. 1908; 4: 61. 1909; Fern Fl. Philipp. 2: 234. 1960; Holttum in



图版 77 1—4. 中华桫欏 *Alsophila costularis* Baker: 1. 羽片 (部分); 2. 小羽片; 3、4. 叶柄基部鳞片。5—7. 阴生桫欏 *Alsophila latebrosa* Wall. ex Hook.: 5. 羽片 (部分); 6. 小羽片 (部分); 7. 裂片。(孙英宝仿《中国树木志》)