

宽约 2 厘米,先端钝圆,基部楔形;生长在海岸常绿阔叶林中或在海岸红树林内缘……………
…………… 57. 象牙树 *D. ferrea* (Willd.) Bakh.

1. 乌柿(浙江) 山柿子(四川),丁香柿(浙江)

Diospyros cathayensis Steward in Journ. Arn. Arb. **35**: 86. 1954; et Man. Vasc. Pls. Low. Yangt. Vall. 303. 1958; 中国高等植物图鉴 **3**: 302, 图 4557. 1974. — *D. sinensis* auct. non Bl. ex Naudin: Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 71. 1889; Diels in Bot. Jahrb. **29**: 527. 1900; Hooker's Icon. **29**: t. 2804. 1906; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. **2**: 591. 1916; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 801. 1936. — *D. armata* auct. non. Hemsl.: Diels, l. c. **29**: 528. f. 4. 1900.

1a. 乌柿(原变种) 图版 16:1

var. *cathayensis*

常绿或半常绿小乔木,高 10 米左右,干短而粗,胸高直径可达 30—80 厘米,树冠开展,多枝,有刺;枝圆筒形,深褐色至黑褐色,有小柔毛,后变无毛,散生纵裂近圆形的小皮孔;小枝纤细,褐色至带黑色,平直,有短柔毛。冬芽细小,长约 2 毫米,芽鳞有微柔毛。叶薄革质,长圆状披针形,长 4—9 厘米,宽 1.8—3.6 厘米,两端钝,上面光亮,深绿色,下面淡绿色,嫩时有小柔毛,中脉在上面稍凸起,有微柔毛,在下面突起,侧脉纤细,每边 5—8 条,小脉不甚明显,结成不规则的疏网状;叶柄短,长 2—4 毫米,有微柔毛。雄花生聚伞花序上,极少单生,花萼 4 深裂,裂片三角形,长 2—3 毫米,两面密被柔毛;花冠壶状,长 5—7 毫米,两面有柔毛,4 裂,裂片宽卵形,反曲;雄蕊 16 枚,分成 8 对,每对的花丝一长一短,有长粗毛,花药线形,短渐尖,退化子房有粗伏毛;花梗长 3—6 毫米,总梗长 7—12 毫米,均密生短粗毛;雌花单生,腋外生,白色,芳香;花萼 4 深裂,裂片卵形,长约 1 厘米,有短柔毛,先端急尖;花冠较花萼短,壶状,有短柔毛,管长约 5 毫米,4 裂,裂片覆瓦状排列,近三角形,长宽各约 2 毫米,反曲,退化雄蕊 6 枚,花丝有短柔毛;子房球形,有长柔毛,6 室,每室有 1 胚珠;花柱无毛,很短,柱头 6 浅裂,突出花冠外;花梗纤细,长 2—4 厘米。果球形,直径 1.5—3 厘米,嫩时绿色,熟时黄色,变无毛;种子褐色,长椭圆形,长约 2 厘米,宽约 7 毫米,侧扁;宿存萼 4 深裂,裂片革质,卵形,长 1.2—1.8 厘米,宽约 8 毫米,先端急尖,有纵脉 9 条;果柄纤细,长 3—4(6) 厘米。花期 4—5 月,果期 8—10 月。

产四川西部、湖北西部、云南东北部、贵州、湖南、安徽南部;生于海拔 600—1500 米的河谷、山地或山谷林中。

四川群众以根和果入药,治心气痛。

本种果柄纤细而长,长 3—4(6) 厘米,宿存萼的裂片宽短,卵形,长 1.2—1.8 厘米,是本种的显著特点。

1b. 福州柿(变种)(中国树木分类学)

var. ***foochowensis*** (Metc. et Chen) S. Lee, comb. nov. — *D. fochowensis* Metc.