

25. 过布柿 (海南植物志): 过布子 (广东海南岛崖县), 五指山柿 (中国树木分类学) 图版 24: 1—4

Diospyros susarticulata Lec. Not. Syst. 4: 120. 1928; Fl. Gén. Indo-Chine 3: 960. 1930; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 13: 67. 1934; L. Chen, l. c. 14: 669 et 15: 119. 1936; 陈嵘, 中国树木分类学, 新一版, 1985. 1959; 海南植物志 3: 154. 1974. — *D. laui* Merr. in herb. quoad S. K. Lau 330.

乔木, 高 12 米, 直径达 35 厘米; 树皮黑色、褐黑色, 有纵裂, 质硬; 除雄花序、萼、冬芽外, 余处均无毛。枝灰黑色, 有纵向浅缝裂, 散生纵裂的椭圆形皮孔; 嫩枝纤细, 黄绿色。冬芽针状, 长 3—6 毫米, 密被淡黄色紧贴的柔毛。叶薄革质, 长椭圆形至椭圆状长圆形, 长 7.5—17 厘米, 宽 3.5—7 厘米, 先端短渐尖, 钝头, 基部楔形, 上面有光泽, 绿色, 下面淡绿色, 中脉上面凹下, 下面明显凸起, 侧脉纤细, 每边 8—11 条, 在两面上都可见, 未达叶缘即网结, 小脉很纤细, 结成小网状, 在两面上明晰; 叶柄纤细, 长 6—10 毫米, 下端在着生处稍上有关节。雄花序单生于当年生枝的叶腋, 有伏贴的小柔毛, 为聚伞花序或短圆锥花序, 很少仅 1 花发育; 雄花: 长约 1 厘米, 花萼 4 裂, 裂片近半圆形或钝三角形, 长 1—3 毫米, 宽约 2 毫米, 边缘有毛; 花冠白色, 花冠管壶形, 长约 7 毫米, 4 裂, 裂片宽卵形或近圆形, 长约 2 毫米, 宽约 3 毫米, 雄蕊 16 枚, 每 2 枚连生成对, 腹面 1 枚较短, 近无毛或略被柔毛; 花梗纤细, 短, 长 2—3 毫米, 在花萼下有关节。雌花未见。果球形, 直径 2—3 厘米, 嫩时绿色, 后变橙黄色, 顶端有小尖头, 除尖头周围有棕色紧贴短硬毛外, 余处无毛, 6 室; 种子长圆形, 长 1.5—2 厘米, 宽 6—10 毫米, 深棕色, 侧扁, 背面较厚; 宿存萼宽约 2 厘米, 外面疏被短毛, 内面密被浅棕色绢毛, 4 裂, 裂片近三角形, 长约 8 毫米, 宽约 1 厘米; 果柄短, 长 3—8 毫米。花期 4—8 月, 果期 8—10 月。

产广东海南; 生于山谷或山上常绿阔叶密林中, 或在山谷溪畔或灌丛中。越南南部和老挝有分布。

本种果实可用于染布。

本种的小枝无毛; 宿存萼 4 浅裂, 果球形, 直径 2—3 厘米, 果柄通常长 5—8 毫米; 叶中等大, 长 7—17 厘米, 宽 3.5—7 厘米, 网结的小脉在两面上都稍明显。

26. 长苞柿 (中国树木分类学) 定春、海蛇李 (广东东方), 白春、乌木、乌茶 (广东海南) 图版 27: 2

Diospyros longibracteata Lec. Not. Syst. 4: 99. 1928; et Fl. Gén. Indo-Chine 3: 923. 1930; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 13: 67. 1934; L. Chen, l. c. 14: 669. 1935; 陈嵘, 中国树木分类学, 新一版, 1987. 1959; 海南植物志 3: 155. 1974.

乔木, 高达 13 米, 胸高直径达 30 厘米; 树皮暗灰黑色或黑色, 有细缝裂; 枝灰黑色或黑褐色, 散生纵裂的长圆形小皮孔; 嫩枝绿褐色; 冬芽针状, 长约 6 毫米, 干时稍呈焦黑色, 散生稀疏的伏柔毛。叶革质, 披针形或长圆状披针形, 长 7—16 厘米, 宽 2—4.5 厘米, 先



1—4. 过布柿 *Diospyros susarticulata* Lec.: 1. 果枝, 2. 雄花枝, 3. 雄花, 4. 雄蕊, 侧面观。5. 五蒂柿 *D. corallina* Chun et L. Chen: 果枝。(何顺清绘)