

花未见。果腋生,单生,近球形,直径3—4厘米,黄绿色,密被短柔毛,有种子3—7颗;种子褐色,近肾形,长1.6—1.8厘米,宽约1.1厘米;宿存萼裂片4,卵形,长1.2—1.8厘米,宽1—1.4厘米,有脉纹,两面有毛;果柄长1.2—2厘米,密被柔毛。果期10月。

仅产于四川盆地东部的华蓥山;生于海拔1300米左右的林中。

本种的嫩枝有小柔毛;果较大,近球形,直径3—4厘米;叶长8—12厘米,叶下面中脉上疏生长伏毛。杨街晋发表本种时认为,本种和信宜柿 *D. sunyiensis* Chun et L. Chen 有亲缘,但后者的叶较大,而果和种子较小。

54. 苗山柿 (广西植物) 图版 36:1

Diospyros miaoshanica S. Lee in *Guihaia* 3(4): 288. 1983.

灌木或小乔木;树皮黑褐色或黄褐色,嫩枝略蜿蜒,有灰黄色绒毛,两年生枝灰黑色,或黄灰色,变无毛。叶革质,长圆形或长椭圆形,长7—17厘米,宽3—5.3厘米,当年生枝上的叶一般长约10—12厘米,先端渐尖,尖头钝,或急尖,基部宽楔形至近圆形,上面深绿色,有光泽,下面淡绿色,除初时中脉上面密被微柔毛,和下面中脉和侧脉上疏生长伏毛外,余处无毛,中脉在上面凹下,下面明显凸起,侧脉每边7—8条,上面稍凸起,下面较明显凸起,将近叶缘即弯向上方,不达边缘,小脉结成稍疏的网,两面都明显;叶柄纤细,在当年生枝上的长约8毫米,有绒毛,老叶的长约1.2厘米,毛渐脱落。雌雄花均未见。嫩果生于当年生枝的基部或下部,果序为聚伞花序式,花序常有花3朵,但仅顶端1花发育成果,两侧的常早落,在果柄的中部左右留下痕迹;果球形,直径2.8—3.5厘米,熟时橙黄色,初时密被伏柔毛,成熟时毛渐脱落;种子三棱形,长约1.5厘米,宽约1厘米,背部厚约6毫米,褐色;宿存萼4深裂,裂片卵形,长约1.8厘米,宽约1厘米,先端急尖或钝,两面都有稍明显的纵脉和网脉,外面有伏柔毛,里面的毛较稀疏,果柄纤细,长约3.2—4厘米,初时有灰黄色绒毛,后变无毛,胚乳均匀,不皱折。果期10月。

产广西(融水九万大山和元宝山)、湖南西部的黔阳;生于山地或山谷疏林中,在九万大山见于海拔900米左右。

本种近似岭南柿 *D. tutcheri* Dunn, 但嫩枝有绒毛,侧脉7—8条,雌花序聚伞花序式,常具3花,果柄远较长,长达3.2—4厘米。本种亦近似越南岷港附近的 *D. longipedicellata* Lec., 但后者叶的基部为心形,侧脉每边11—12条,果为卵形,宿存萼的裂片长圆形,长9—11毫米。

55. 网脉柿 (云南热带亚热带植物区系研究报告)

Diospyros reticulineris C. Y. Wu, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 12. 1965.

55a. 网脉柿 (原变种)

var. ***reticulineris***

小乔木,高6米。幼枝、冬芽、叶上面中脉和侧脉上、叶柄、宿存萼和果柄均被污黄色



1. 苗山柿 *Diospyros miaoshanica* S. Lee: 果枝。2. 象牙树 *D. ferrea* (Willd.) Bakh.: 果枝。3—5. 海边柿 *D. maritima* Bl.: 3. 果枝, 4. 叶正面观, 5. 叶背面观。(刘宗汉绘)