

1.5 厘米,基部阔楔形,嫩叶两面均有柔毛,老叶无毛,边缘膜质,全缘,有微小的腺点;中脉在叶面凹下,侧脉和网脉在叶面均微凸起,侧脉每边 7—8 条;叶柄长 2—3 毫米,有柔毛。花未见。果序总状,长约 2 厘米,被短柔毛,果柄长 2—2.5 毫米;宿存小苞片三角状卵形,长约 0.8 毫米。核果瓶形,长约 7 毫米;顶端宿萼裂片三角状卵形,直立。果期 8—9 月。

产西藏、云南(贡山)。生于海拔 850—1200 米的山坡、路边、常绿树林中。模式标本采自西藏米林。

44. 梨叶山矾(新拟)

Symplocos pyrifolia Wall. ex G. Don, Gen. Syst. 4: 3. 1837; DC. Prodr. 8: 256. 1844; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 579. 1882; Brand in Engler, Pflanzenr. 6(IV. 242): 60. 1901; Noot. Rev. Symplocac. 270. 1975. pro parte excl. syn.

灌木或小乔木。叶革质,无毛,椭圆状披针形、狭椭圆形或长圆状椭圆形,长 7—12 厘米,宽 2—3 厘米,先端渐尖,基部楔形,全缘或具腺状齿;中脉在叶面凹下;叶柄长 10—20 毫米。总状花序长约 4 厘米,被柔毛;苞片椭圆形或圆形,被柔毛;花萼长约 3 毫米,萼筒长 1.5 毫米,无毛,萼裂片卵形或三角形,与萼筒等长或稍长于萼筒;花冠长约 5 毫米;雄蕊约 35 枚,较花冠长;花盘有短柔毛。核果圆柱状椭圆形,长约 8 毫米,无毛,顶端具宿萼裂片。

产西藏南部。生于海拔 1400—2400 米的林中。印度北部、尼泊尔、锡金、不丹也有。模式标本采自孟加拉的锡尔赫特。

45. 腺斑山矾(植物分类学报) 图版 18

Symplocos glandulosopunctata Y. F. Wu in Acta Phytotax Sin. 20(1): 94. 1982.

乔木,高约 5 米。顶芽卵形,长约 1.5 厘米,密被灰黄色短柔毛。嫩枝、叶柄、果序轴、果柄均被褐色长硬毛。叶纸质,长圆状椭圆形或狭椭圆形,长 14—17 厘米,宽 4—5.5 厘米,先端渐狭长尖,基部楔形或阔楔形,叶面近无毛,叶背被长硬毛,毛的基部有褐色腺状斑点,边缘具胼胝质的锐锯齿,中脉和侧脉在叶面均凹下,有褐色短硬毛,侧脉每边 7—10 条;叶柄长 1—1.6 厘米。花未见。果序总状,长约 9 厘米;果柄长 3—6 毫米。核果卵球形,成熟时蓝色,长 7—8 毫米,直径约 5 毫米,被疏长毛,顶端具 5 角形凸起,被毛;宿萼裂片直立,三角形,长约 1 毫米。果期 8 月。

产西藏墨脱。生于海拔 2300 米的山坡阔叶林中。模式标本采自西藏墨脱。

46. 滇灰木(中国高等植物图鉴) 图版 19: 1—6

Symplocos yunnanensis Brand in Engler, Pflanzenr. 6(IV. 242): 68. 1901; Hand.-Mazz. et Peter-Stib. in Beih. Bot. Centralbl. 62(B): 28. 1943; 中国高等植物图鉴 3: 320、图 4593. 1974——*S. macrophylla* Wall. ex DC. ssp. *sulcata* (Kurz) Noot.



腺斑山矾 *Symplocos glandulosopunctata* Y. F. Wu: 1.果枝, 2.叶背面放大示腺状斑点, 3.核果, 4.核果横切面。(余峰绘)