

下,侧脉每边 6—10 条,在近叶缘处分叉网结;叶柄长 4—8 毫米。穗状花序常集中在枝顶,长 6—9(11) 厘米,花序轴和苞片,小苞片背面均被短柔毛;苞片卵形,小苞片三角状卵形,背面中肋凸起;花萼无毛,长约 2 毫米,5 裂,裂片阔卵形,与萼筒等长;花冠白色,长 5—6 毫米,5 深裂几达基部,雄蕊约 40 枚,花丝长 5—6 毫米;花盘环状,无毛;子房 3 室。核果灰绿色,近球形,直径约 4 毫米,顶端宿萼裂片直立或合成圆锥状。花期 5 月,果期 7—11 月。

产广东海南。生于海拔 300—500 米的湿润岩石地或溪边林中。越南也有。模式标本采自越南。

#### 57. 短穗花山矾(台湾木本植物志)

**Symplocos divaricativena** Hayata, Icon. Pl. Formos 5: 96. f. 25g. 1915; Mori in Sylvania 6: 18. f. 5. 1935; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 584. f. 540. 1936; Li, Woody Fl. Taiwan 741. 1963; 刘业经,台湾木本植物志 248. 1976.——*Bobua divaricativena* (Hayata) Kanehira et Sasaki in Sasaki, List Pl. Formos 330. 1928.——*S. cochinchinensis* (Lour.) S. Moore ssp. *laurina* (Retz.) Noot. var. *laurina* Noot. Rev. Symplocac. 156. 1975, et in Fl. Taiwan 4: 118. 1978. pro parte quoad syn. *S. divaricativena* Hayata

灌木;小枝褐色,无毛。叶纸质或革质,披针状长圆形、狭椭圆形或椭圆形,长 4—7 厘米,宽 1.5—2.5 厘米,先端短渐尖或钝,基部楔形,近全缘或具不明显的齿,两面均无毛;中脉在叶面凹下,侧脉细而不明显;叶柄长约 1 厘米。花未见。穗状果序轴腋生,核果球形,无柄,直径约 3—4 毫米,顶端有宿萼裂片,基部有宿存苞片。果期 10 月。

台湾特产,生于海拔 2500 米的林中。

#### 58. 少脉山矾(新拟) 图版 21: 6—7

**Symplocos paucinervia** Noot. Rev. Symplocac. 262. 1975.

灌木;小枝无毛,顶芽被柔毛。叶狭椭圆形或椭圆形,长 4—7 厘米,宽 1—3 厘米,先端渐尖,基部渐狭而下延至叶柄,两面均无毛;中脉在叶面凹下,侧脉每边 3—5 条;叶柄长 5—7 毫米。穗状花序长 3—4 厘米,被褐色短柔毛;苞片长圆形,长约 3 毫米,有腺点,早落;花萼长约 3 毫米,裂片长圆形,被短柔毛和腺点,稍长于萼筒;花冠白色,长 5—6 毫米,5 深裂几达基部,裂片长圆形;雄蕊 20—35 枚,基部稍联合;花柱长约 4 毫米;花盘有腺点和柔毛。核果未见。

产广西。生于灌木林中。模式标本采自广西靖西县南区乐村。

原记载: 花为总状花序,根据我们观察花为穗状花序。

组 5. 团伞组——Sect. *Glomeratae* Y. F. Wu in Act. Phytotax. Sin. 24(3): 193. 1986.

花排成团伞花序;核果圆柱形。

本组我国有 15 种。