

269. 1942.——*Dicalix stellaris* (Brand) Migo in Journ. Shanghai Sci. Inst. **13**: 206. 1943.

常绿乔木,小枝粗,髓心中空,具横隔;芽、嫩枝、嫩叶柄、苞片和小苞片均被红褐色绒毛。叶厚革质,叶面有光泽,叶背粉褐色,披针状椭圆形或狭长圆状椭圆形,长6—20厘米,宽2—5厘米,先端急尖或短渐尖,基部阔楔形或圆,通常全缘,很少有细齿;中脉在叶面凹下,在叶背明显凸起,侧脉每边9—15条,侧脉和网脉在叶面均凹下,在叶背不明显;叶柄有纵沟,长1.5—2.5厘米。团伞花序着生于二年生枝的叶痕之上;苞片圆形,直径3—4毫米,有缘毛;花萼长约3毫米,裂片半圆形,长不到1毫米,有长缘毛;花冠白色,长7—8毫米,5深裂几达基部,裂片椭圆形,顶端有缘毛,雄蕊18—25枚,花丝基部合生成5束;花盘圆柱形,无毛;子房3室;核果狭卵状圆柱形,长约1厘米,顶端宿萼裂片直立;核具6—8条纵棱。花期4—5月,果期6月。

产长江以南及台湾各省区。生于海拔1100米的山地、路旁、疏林中。模式标本采自四川南川。

67. 卷毛山矾(植物分类学报) 图版24: 7—8

Symplocos ulotricha Ling in Acta Phytotax. Sin. **1**: 216. 1951.

乔木,高约7米。嫩枝粗壮,圆柱形,径4—5毫米,密被锈色卷曲柔毛,老枝无毛;芽、嫩叶背面、嫩叶柄均被红褐色绒毛。叶厚革质,干时榴红色,长圆形或长圆状卵形,长7—15厘米,宽2.5—5.5厘米,先端急尖、渐尖或圆钝,基部圆形或阔楔形,全缘,背卷;中脉和侧脉在叶面均凹下,侧脉每边8—13条;叶柄粗,有纵沟,长1—1.8厘米。团伞花序生于叶已脱落的叶痕之上;苞片圆形,直径约3毫米,外面密被长柔毛;花萼长约5毫米,裂片长圆形,长2.5—3毫米,无缘毛;花冠白色,长约6毫米,5深裂几达基部,裂片长圆形,顶端无缘毛;雄蕊35—50枚,花丝基部合生;花盘环形,无毛,子房3室。核果圆柱形,长约1厘米,顶端宿萼裂片长2.5—3毫米,直立;核有5—6条浅纵棱。花果期4—11月,边开花边结果。

产福建、广东。生于海拔900—1100米的山坡、路边或密林中。模式标本采自福建。

68. 大叶山矾(中国高等植物图鉴)

Symplocos grandis Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl. **62** (B): 15. 1943; 中国高等植物图鉴**3**: 309. 图4571. 1974.——*Dicalix wangii* Migo in Journ. Shanghai Sci. Inst. **13**: 208. 1943.——Noot. Rev. Symplocac. 196. 1975. pro syn., sub nom. *S. glauca* (Thunb.) Koidz. quoad specimen Forrest 2464.

乔木,高8—15米;幼枝、嫩叶背面、叶柄、苞片、萼裂片均被有褐色皱曲绒毛,老枝无毛,黑褐色,髓心横隔状。叶革质,干后绿色或黄褐色,椭圆形、卵状椭圆形,长10—25厘米,宽3.5—5(9)厘米,先端渐尖或急尖,基部圆钝或阔楔形,全缘或上部具细尖齿;中脉在叶面凹下,嫩时有柔毛,侧脉每边9—14条,斜向上,在离叶缘4—7毫米处网结;叶柄有



1—6.老鼠矢 *Symplocos stellaris* Brand: 1.小枝, 2.花枝, 3.花冠展开示雄蕊, 4.花去花冠、雄蕊示花盘和雌蕊, 5.果枝, 6.核果。7—8.卷毛山矾 *Symplocos ulotricha* Ling: 7.果枝, 8.核果。9.福建山矾 *Symplocos fukienensis* Ling。(余峰绘)