

密被灰黄色或黄褐色星状绒毛,有 10—12 棱,棱间有粗皱纹,顶端具凸尖,外果皮厚约 1 毫米,中果皮纤维状木栓质,厚达 1 厘米,内果皮木质,向中果皮放射形成许多间隙;种子 2—4 颗,圆柱形,长约 2 厘米。花期 3—5 月,果期 8—9 月。

产云南东南部、贵州(榕江、独山)、广西(那坡、大苗山)和广东(云浮)。生于海拔 500—1500 米密林中。模式标本采自贵州独山。越南北部也有。

2. **木瓜红**(四川峨眉) 野草果(云南文山),大果芮德木、硕果芮德木(中国植物图谱)图版 46: 7—10

Rehderodendron macrocarpum Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. **3**:78. 321. Pl. 1. 1932 et **6**:175. 1935; Hu et Chun, Icon. Pl. Sin. **5**:45. Pl. 245. 1937; Fang, Icon. Pl. Omei **1**(1):Pl. 49. 1942; 陈嵘, 中国树木分类学 1001. 1937; 中国高等植物图鉴 **3**:333. 图 4620. 1974; S. M. Hwang in Acta Phytotax. Sin. **18**(2):166. 1980.——*R. mapienense* Hu, op. cit. **3**:79. Pl. 2. 1932.

小乔木,高 7—10 米,胸径约 20 厘米;树皮灰黑色;小枝紫红色,被毛,老枝灰黄色或灰褐色,无毛;冬芽卵形或长卵形,最外的鳞片被短柔毛。叶纸质至薄革质,长卵形、椭圆形或长圆状椭圆形,长 9—13 厘米,宽 4—5.5 厘米,顶端急尖或短渐尖,基部楔形或宽楔形,边缘有疏锯齿,上面绿色,下面灰绿色,叶脉常呈紫红色,除嫩叶脉上被星状柔毛外,其余无毛,侧脉每边 7—13 条,和网脉在两面均明显隆起;叶柄长 1—1.5 厘米,疏被星状柔毛。总状花序有花 6—8 朵,生于小枝下部叶腋,长 4—5 厘米;花序梗、花梗和小苞片外面均密被灰黄色星状柔毛;花白色,与叶同时开放;花梗长 3—10 毫米;小苞片披针形,着生于花梗近中部,长约 5 毫米,早落;花萼高约 4 毫米,宽约 3 毫米,萼齿三角形,顶端渐尖,长约 2 毫米,密被星状短柔毛;花冠裂片椭圆形或倒卵形,长 1.5—1.8 厘米,宽 5—8 毫米,顶端钝圆,两面均密被细绒毛;雄蕊长者较花冠稍长,短者与花冠近相等;花柱棒状,较雄蕊稍长。果实长圆形或长卵形,稍弯,长 3.5—9 厘米,宽 2.5—3.5 厘米,有 8—10 棱,棱间平滑,无毛,熟时红褐色,顶端收狭成脐状凸起,外果皮厚 1.5 毫米,中果皮纤维状木栓质,厚约 10 毫米,内果皮木质,向中果皮放射成许多间隙;种子长圆状线形,栗棕色,长 2—2.5 厘米。花期 3—4 月,果期 7—9 月。

产四川(马边、峨眉、峨边)、云南(金平、文山、彝良)和广西(凌云)。生于海拔 1000—1500 米密林中。模式标本采自四川峨眉山。

木材致密,可作家具用材;果红色,花白色,美丽芳香,可作绿化观赏树种。

3. **广东木瓜红**(中国高等植物图鉴) 岭南木瓜红(中国树木分类学),红木冬瓜木(海南),粤芮德木(中国植物图谱) 图版 47

Rehderodendron kwangtungense Chun in Sunyatsenia **1**(4):290. Pl. 38.(1—3): 1934 et **3**(1): 31. f. 5. 1935; Hu et Chun, Icon. Pl. Sin. **5**: 47. Pl. 247. 1937; 陈嵘, 中国树木分类学 1002. 图 887. 1937; 中国高等植物图鉴 **3**:333. 1974; S. M. Hwang in Acta



1—6. 贵州木瓜红 *Rehderodendron kweichowense* Hu: 1. 果枝, 2. 花枝, 3. 花, 4. 花冠展开示雄蕊, 5. 雌蕊, 6. 果实横切。7—10. 木瓜红 *Rehderodendron macrocarpum* Hu: 7. 花枝, 8. 花冠放大示雄蕊, 9. 雌蕊, 10. 果实。(邓晶发绘)