

1. 木犀亚科——OLEOIDEAE

Knobl. in Engl. & Plantl, Nat. Pflanzenfam 4(2): 5. 1895.

子房每室具下垂胚珠 2 或多枚,胚珠着生于子房上部。果为翅果,蒴果、核果或浆果状核果。胚根向上。

3 族,约 23 属。我国产 3 族,9 属。

1. 梣族——Trib. FRAXINEAE Endl.

Endl. Gen. 573. 1838.

叶对生,单叶或奇数羽状复叶。花两性、单性或杂性,雌雄同株或异株;花萼 4 裂或无花萼;花冠 4 裂或无花冠。翅果,翅着生果端或四周。

2 属,我国均产。

1. 雪柳属*——*Fontanesia* Labill.

Labill. Icon. Pl. Syr. 1: 9, t. 1. 1791.

落叶灌木,有时呈小乔木状。小枝四棱形。叶对生,单叶,常为披针形,全缘或具齿;无柄或具短柄。花小,多朵组成圆锥花序或总状花序,顶生或腋生;花萼 4 裂,宿存;花冠白色、黄色或淡红白色,深 4 裂,基部合生;雄蕊 2 枚,着生于花冠基部,花丝细长,花药长圆形;子房 2 室,每室具下垂胚珠 2 枚,花柱短,柱头 2 裂,宿存。果为翅果,扁平,环生窄翅,每室通常仅有种子 1 枚;种子线状椭圆形,种皮薄;胚乳丰富,肉质;子叶长卵形,扁平;胚根向上。染色体基数 $x = 13$ 。

本属模式种: *Fontanesia phillyreoides*. Labill.

2 种。我国和地中海地区各产 1 种。

1. 雪柳(植物名实图考) 五谷树(安徽),挂梁青(浙江) 图版 1:1—4

Fontanesia fortunei Carr. in Rev. Hort. Paris 1859: 43, f. 9. 1859; Hemsl. in Journ. Bot. 17: 212. 1879; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 8: 189. 1927, 15: 302. 1934; P'ei in Contr. Biol. Lab.Sci. Soc. China Bot. Ser. 10: 44. 1935; Steward, Man. Vasc. Pl. Low. Yangtze Valley China 308. 1958; 中国高等植物图鉴 3: 342, 图 4638. 1974; 秦岭植物志 1(4): 66, 图 66. 1983; 云南植物志 4: 603. 1986. —*F. philly-*

* 雪柳属(中国树木分类学)