

具睫毛;花冠黄色,长约 1.5 厘米,花冠管长 5—6 毫米,裂片长圆形或椭圆形,长约 1 厘米,宽约 6 毫米,内有红色条纹,先端钝或具微凸头;雄蕊长于花冠管;雌蕊短于雄蕊。果卵球形,长 0.8—1 厘米,宽 5—8 毫米,先端呈喙状,皮孔不明显;果梗长 2—4 毫米。花期 4—5 月,果期 6—10 月。

产于云南西北部、四川木里。生山坡灌丛、林下,或山地混交林中。模式标本采自云南丽江。

本种与秦连翘 *F. giraldiana* Lingelsh. 极其相似,不同仅在于后者除具全缘、两面无毛的叶片外,也具被毛和疏生小锯齿的叶片,其他特征基本一致。根据目前所占有的本种标本,在西南地区分布最北至北纬 28 度 15 分。而秦连翘在西北地区分布最南至北纬 31 度 58 分,其间未见有上述二种标本的分布,由此可见已形成了间断分布的替代种。

4. 丁香属*——*Syringa* Linn.

Linn. Sp. Pl. 9. 1753 et Gen. Pl. ed. 5, 9. 1754; Knobl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(2): 7. 1895, excl. Sect. Sarcocarpion; McKelvey, Lilac 9. 1928; Pringle in Bailey 21 (3): 101. 1981.

落叶灌木或小乔木。小枝近圆柱形或带四棱形,具皮孔。冬芽被芽鳞,顶芽常缺。叶对生,单叶,稀复叶,全缘,稀分裂;具叶柄。花两性,聚伞花序排列成圆锥花序,顶生或侧生,与叶同时抽生或叶后抽生;具花梗或无花梗;花萼小,钟状,具 4 齿或为不规则齿裂,或近截形,宿存;花冠漏斗状、高脚碟状或近幅状,裂片 4 枚,开展或近直立,花蕾时呈镊合状排列;雄蕊 2 枚,着生于花冠管喉部至花冠管中部,内藏或伸出;子房 2 室,每室具下垂胚珠 2 枚,花柱丝状,短于雄蕊,柱头 2 裂。果为蒴果,微扁,2 室,室间开裂;种子扁平,有翅;子叶卵形,扁平;胚根向上。染色体基数 $x = 23$, 或 22, 24。

本属后选模式种: 欧丁香 *Syringa vulgaris* Linn.

约 19 种,不包括自然杂交种,东南欧产 2 种,日本、阿富汗各产 1 种,喜马拉雅地区产 1 种,朝鲜和我国共具 1 种、1 亚种、1 变种,其余均产我国,主要分布于西南及黄河流域以北各省区,故我国素有丁香之国之称。

本属中有不少种类的花是提取香精,配制高级香料的原料;又枝叶繁茂、花色淡雅而清香,故庭园广为栽培供观赏,为庭园中之珍品。欧美对本属进行杂交育种已有近百年的历史,先后曾选育出数百个栽培品种。近年来北京植物园也开展了此项研究,目前已培育成紫云 *Syringa oblata* cv. “Zi Yun”, 罗蓝紫 *S. oblata* cv. “Luolanzi”, 香雪 *S. oblata* cv. “Xiangxue”, 春阁 *S. vulgaris* cv. “Chun’ge” 等新品种。

* 丁香属(中国树木分类学), 紫丁香属(植物学大辞典), 丁香花属(种子植物名称)

具睫毛;花冠黄色,长约 1.5 厘米,花冠管长 5—6 毫米,裂片长圆形或椭圆形,长约 1 厘米,宽约 6 毫米,内有红色条纹,先端钝或具微凸头;雄蕊长于花冠管;雌蕊短于雄蕊。果卵球形,长 0.8—1 厘米,宽 5—8 毫米,先端呈喙状,皮孔不明显;果梗长 2—4 毫米。花期 4—5 月,果期 6—10 月。

产于云南西北部、四川木里。生山坡灌丛、林下,或山地混交林中。模式标本采自云南丽江。

本种与秦连翘 *F. giraldiana* Lingelsh. 极其相似,不同仅在于后者除具全缘、两面无毛的叶片外,也具被毛和疏生小锯齿的叶片,其他特征基本一致。根据目前所占有的本种标本,在西南地区分布最北至北纬 28 度 15 分。而秦连翘在西北地区分布最南至北纬 31 度 58 分,其间未见有上述二种标本的分布,由此可见已形成了间断分布的替代种。

4. 丁香属*——*Syringa* Linn.

Linn. Sp. Pl. 9. 1753 et Gen. Pl. ed. 5, 9. 1754; Knobl. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(2): 7. 1895, excl. Sect. Sarcocarpion; McKelvey, Lilac 9. 1928; Pringle in Bailey 21 (3): 101. 1981.

落叶灌木或小乔木。小枝近圆柱形或带四棱形,具皮孔。冬芽被芽鳞,顶芽常缺。叶对生,单叶,稀复叶,全缘,稀分裂;具叶柄。花两性,聚伞花序排列成圆锥花序,顶生或侧生,与叶同时抽生或叶后抽生;具花梗或无花梗;花萼小,钟状,具 4 齿或为不规则齿裂,或近截形,宿存;花冠漏斗状、高脚碟状或近幅状,裂片 4 枚,开展或近直立,花蕾时呈镊合状排列;雄蕊 2 枚,着生于花冠管喉部至花冠管中部,内藏或伸出;子房 2 室,每室具下垂胚珠 2 枚,花柱丝状,短于雄蕊,柱头 2 裂。果为蒴果,微扁,2 室,室间开裂;种子扁平,有翅;子叶卵形,扁平;胚根向上。染色体基数 $x = 23$, 或 22, 24。

本属后选模式种: 欧丁香 *Syringa vulgaris* Linn.

约 19 种,不包括自然杂交种,东南欧产 2 种,日本、阿富汗各产 1 种,喜马拉雅地区产 1 种,朝鲜和我国共具 1 种、1 亚种、1 变种,其余均产我国,主要分布于西南及黄河流域以北各省区,故我国素有丁香之国之称。

本属中有不少种类的花是提取香精,配制高级香料的原料;又枝叶繁茂、花色淡雅而清香,故庭园广为栽培供观赏,为庭园中之珍品。欧美对本属进行杂交育种已有近百年的历史,先后曾选育出数百个栽培品种。近年来北京植物园也开展了此项研究,目前已培育成紫云 *Syringa oblata* cv. “Zi Yun”, 罗蓝紫 *S. oblata* cv. “Luolanzi”, 香雪 *S. oblata* cv. “Xiangxue”, 春阁 *S. vulgaris* cv. “Chun’ge” 等新品种。

* 丁香属(中国树木分类学), 紫丁香属(植物学大辞典), 丁香花属(种子植物名称)