

单叶,全缘,叶片下面常被毛。花序常由顶芽抽生,基部常有叶;花药黄色。果具皮孔或皮孔不明显。

约9种。我国产7种,1变种,1变型。

1. 藏南丁香(云南植物研究) 图版 15:1—2

Syringa tibetica P. Y. Bai in Acta Bot. Yunnan. 1(1):151, f. 1. 1979; 西藏植物志 3: 877, 图 337, 6—11. 1986. ——*S. emodi* auct. non Wall. ex G. Don 1837: 西藏植物志 3: 877. 1986.

小乔木,高2.5—4米。枝灰棕色,无毛,具皮孔,小枝红褐色,密被短柔毛,皮孔长圆形,明显,呈淡白色。叶片长圆形或长圆状椭圆形,长7—10厘米,宽3.5—5厘米,先端急尖或短渐尖,基部楔形至近圆形,上面黄绿色,沿中脉和侧脉密被或疏被短柔毛,其余近无毛或疏被短柔毛,下面苍白色,密被短柔毛或仅沿叶脉被短柔毛,中脉和侧脉在上面平,下面微凸起,侧脉4—7对,细脉在上面凹入,下面不明显;叶柄扁平,密被短柔毛。圆锥花序由顶芽抽生,长7—13厘米;花序轴、花梗、花萼密被短柔毛;花梗长1—2毫米;花萼长2—3毫米,萼齿呈三角状卵形,或为不规则波状浅齿;花冠白色,花冠管长5—7毫米,裂片反折,披针形,先端向内弯呈兜状而具喙;花丝长约1毫米,花药黄色,长圆形,长约2毫米,全部露在花冠管外。果未见。花期6月。

产于我国西藏吉隆。生山地林缘或山麓,海拔2900—3200米。模式标本采自该县。

2. 云南丁香(中国树木分类学)

Syringa yunnanensis Franch. in Rev. Hort. 1891:308. 332. 1891; Bretschneid. Hist. Europ. Bot. Discov. China 905. 1898; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 2:780, f. 488 p-r, 489 g. 1911; Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. 7:257. 1912; Rehd. in Bailey, Stand. Cycl. Hort. 6:3302. 1917 et Bibl. Cult. Trees & Shrubs 564. 1949 et Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 6, 778. 1954; Lingelsh. in Engl. Pflanzenr. 72(IV-243):95. 1920; McKelvey, Lilac 29, pl. 6—10. 1928; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7(4): 1005. 1936; 陈嵘, 中国树木分类学 1042, 图 924. 1937; 中国高等植物图鉴 3: 349, 图 4651. 1974; 云南植物志 4: 616, 图版 175, 1—3. 1986; 西藏植物志 3: 875, 图 337, 1—5. 1986.

2a. 云南丁香(原变型) 图版 15:3—4

f. *yunnanensis*

灌木,通常高2—5米。枝直立,灰褐色,无毛,具皮孔,小枝红褐色。圆柱形或略呈四棱形,无毛,稀有被微柔毛,具白色皮孔。叶片椭圆形、椭圆状披针形或倒卵形至倒披针形,长2—8(—13)厘米,宽1—3.5(—5.5)厘米,先端锐尖或短渐尖,基部楔形或宽楔形,稀近圆形,叶缘具短睫毛或无毛,上面深绿色,下面粉绿色,无毛,稀仅沿叶脉略被微柔毛,有时具褐色斑点;叶柄长0.5—2厘米,无毛。圆锥花序直立,由顶芽抽出,塔形,长5—18