

除原变种 *var. microphylla* 外,尚有以下 1 变种:

8d. 黄药小叶巧玲花(变种) 黄药小叶丁香(植物研究)

*var. flavoanthera* (X.L.Chen) M.C.Chang, comb. nov. — *S. microphylla* Diels

*var. flavoanthera* X.L. Chen in Bull. Bot. Res. 9 (3):41. 1989.

与原变种区别在于本变种的花为白色,花药为黄色。花期 5 月,果期 8—9 月。

产于陕西佛坪县。生海拔 1900 米。模式标本采自该县。

9. 蓝丁香(河南,中国树木分类学) 南丁香(河南)

*Syringa meyeri* Schneid. in Sargent, Pl. Wils. 1:301. 1912, 3:433. 1917 et Ill. Handb. Laubh. 2:1062, f. 628 c. 1912; Rehd. in Bailey, Stand. Cycl. Hort. 6:3302. 1917 et Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 6, 781. 1954; Lingelsh. in Engl. Pflanzenr. 72(IV-243):85. 1920; McKelvey, Lilac 169. 1928; 陈嵘, 中国树木分类学 1052, 图 935. 1937; 中国高等植物图鉴 3: 350. 1974.

9a. 蓝丁香(原变种)

*var. meyeri*

矮灌木,枝叶密生,高达 1.5 米。枝直立,灰棕色,具皮孔,小枝四棱形,被微柔毛,具皮孔。叶片椭圆状卵形或椭圆状倒卵形或近圆形,有时卵形,长 2—5 厘米,宽 1.5—3.5 厘米,先端锐尖、短渐尖或钝,基部楔形、宽楔形或近圆形,叶缘具睫毛,上面深绿色,微带紫褐色,无毛,下面淡绿色,无毛或沿叶脉基部被柔毛,下方 2 对侧脉汇合自基部弧曲达上部;叶柄长 0.6—1.5 厘米,无毛或被微柔毛。圆锥花序直立,由侧芽抽生,稀顶生,长 2.5—10 厘米,宽 2.5—4 厘米,花密生;花序轴和花梗被微柔毛;花梗长 1—2 毫米;花萼暗紫色,无毛或被微柔毛,长约 2 毫米,萼齿锐尖;花冠蓝紫色,花冠管近圆柱形,长约 1.5 厘米,裂片展开,长圆形,长 2—4 毫米,先端内弯呈兜状而具喙;花药初浅棕色,后呈黑色,长圆形,长约 2 毫米,位于距花冠管喉部约 2 毫米处。果长椭圆形,长 1—2 厘米,先端渐尖,具皮孔。

本种花期较长,每年开花二次,第一次 4—6 月,第二次 8—9 月,且树形较矮而雅致,北京、西安等地多作园林观赏树种。

到目前为止,仅知其为栽培种,最初发现栽种于北京丰台庭园中。过去认为本种可能从巧玲花 *S. pubescens* Turcz. 中选育而成。目前发现野生种小叶蓝丁香 *S. meyeri* *var. spontanea* M. C. Chang, 根据二者叶脉特征,分析可能自该变种选育而成。

9b. 小叶蓝丁香(变种)(考察与研究) 图版 19: 1—2

*var. spontanea* M.C.Chang in Investigat. Stud. Nat. 10:33. 1990. — *S. microphylla minor* Dropmore Cat. 12. 1966 ex P.S.Green 1979. — *S. meyeri* cv. 'Palibin Krüssmann, Handb. Laubgehölze ed.2, 3:399. 1978; Alexander in Arnoldia 38(3):70. 1978; P. S. Green in Curtis's Bot. Mag. 182:t. 778. 1979. — *S. microphylla* auct. non Diels 1900: M. Noda, Fl. N.-E. Prov. China 1015, pl. 203, f. 4. 1971, sphalm.