

f. 3.

与原变种区别在于本变种的叶片近圆形或宽卵形,较小,长1—2厘米,宽0.8—1.8厘米,近于掌状5出脉,较明显;花紫色,疏生。花期5月,果期9—10月。

产于辽宁金县和尚山。生500米左右的山坡石缝间。北京、沈阳等地也有栽培。模式标本采自该县。

除原变型 *f. spontanea* 外,尚有以下1变型:

9b₁. 白花小叶蓝丁香(变型)(考察与研究)

f. alba (Wang, Fuh & Chao) M.C.Chang in *Investigat. Stud. Nat.* 10:33. 1990. — *S. microphylla* Diels var. *alba* Wang, Fuh & Chao in *Ill. Fl. Lign. Pl. N.-E. China* 474. 1955, Addenda 567. 1955. — *S. microphylla f. alba* (Wang, Fuh & Chao) Kitagawa, *Neo-Lineament. Fl. Mansh.* 511. 1979.

花白色。花期5月。

产于辽宁金县。生山坡。模式标本采自该县。

10. 皱叶丁香(中国树木分类学)

Syringa mairei (Lévl.) Rehd. in *Journ. Arn. Arb.* 15:302. 1934; Lauener & P.S. Green in *Not. Bot. Gard. Edinb.* 37(1):129. 1978; 云南植物志 4: 618. 1986; 西藏植物志 3: 878. 1986. — *Ligustrum mairei* Lévl. *Cat. Pl. Yun-Nan* 181. 1916; Mansf. in *Bot. Jahrb.* 59, Beibl. 132:72. 1924. — *Syringa rugulosa* McKelvey in *Journ. Arn. Arb.* 6:153. 1925 et *Lilac* 148. 1928; 陈嵘, 中国树木分类学 1050. 1937.

灌木或小乔木,高约2米。小枝淡褐色,圆柱形,密被短柔毛,疏生皮孔,老枝棕褐色,无毛。叶片革质,卵形、宽椭圆形至近圆形,或倒卵形,长2—9厘米,宽(1—)2—5厘米,先端锐尖、凸尖或钝,基部楔形、宽楔形至近圆形,叶缘具睫毛,上面绿色,疏被或密被短柔毛,下面绿白色,密被柔毛,中脉和侧脉在上面凹入,下面凸起,细脉在上面明显凹入使叶面呈皱缩;叶柄长2—7毫米,密被柔毛。圆锥花序由侧芽抽生,稀顶生,长6—14厘米;花序轴密被短柔毛或较疏,皮孔明显;近无梗;花萼红紫色,密被微柔毛或较疏,长约2毫米,萼齿先端锐尖、渐尖或钝;花冠紫红色,盛开时呈白色,花冠管近圆柱形,细弱,长0.6—1.1厘米,裂片展开,卵形至长圆状椭圆形,长3—5毫米,先端有时内弯略呈兜状而具喙;花药黄色,长3—3.5毫米,位于距花冠管喉部0—1毫米处。果长圆状披针形,长1—2厘米,宽3—5毫米,先端渐尖,皮孔不明显。花期7月,果期7—11月。

产于四川西部、云南北部、西藏东南部。生1900—2600米的山坡或路边灌丛。模式标本采自云南东北部的岔河。

11. 松林丁香(云南植物志) 野丁香(中国树木分类学) 图版19:3—4

Syringa pinetorum W. W. Smith in *Not. Bot. Gard. Edinb.* 9: 132. 1916; Rehd. *Man. Cult. Trees & Shrubs* 754. 1927 et *Bibl. Cult. Trees & Shrubs* 565. 1949;