

花重瓣,紫色。

我国有栽培。

15. 花叶丁香(河南,中国树木分类学) 波斯丁香(译称)

Syringa × *persica* Linn. Sp. Pl. 9. 1753, excl. β .; Miller, Gard. Dict. ed. 8, no. 2. 1768; Willd. Sp. Pl. 1:48. 1797, excl. β .; Lingelsh. in Engl. Pflanzenr. 72 (IV-243):90. 1920; McKelvey, Lilac 433, pl. 143. 146. 148. 1928; 陈嵘,中国树木分类学 1055, 图 938. 1937; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 26:75. 1945; Grohmann in Fl. West. Pakistan 25. 1974. — *S. persica* 3 *caerulea* Weston, Bot. Univ. 1:289. 1770. — *S. persica* a. Linn. Sp. Pl. 9. 1753; Willd. Sp. Pl. 1:48. 1797. — *S. persica* a. *integrifolia* Vahl, Enum. Pl. 1:38. 1804; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 6, 782. 1954. “var.”

15a. 花叶丁香(原变型)

f. *persica*

小灌木,高 1—2 米,或达 3 米。枝细弱,开展,直立或稍弓曲,灰棕色,无毛,具皮孔,小枝无毛。叶片披针形或卵状披针形,长 1.5—6 厘米,宽 0.8—2 厘米,先端渐尖或锐尖,基部楔形,全缘,稀具 1—2 小裂片,无毛;叶柄长 0.5—1.3 厘米,无毛。花序由侧芽抽生,长 3—10 厘米,通常多对排列在枝条上部呈顶生圆锥花序状;花序轴无毛,具皮孔;花梗长约 1.5—3 毫米,无毛;花芳香;花萼无毛,长约 2 毫米,具浅而锐尖的齿,或萼齿呈三角形;花冠淡紫色,花冠管细弱,近圆柱形,长 0.6—1 厘米,花冠裂片呈直角开展,宽卵形、卵形或椭圆形,长 4—7 毫米,兜状,先端尖或钝;花药小,不孕,淡黄绿色,着生于花冠管喉部之下。果未见。花期 5 月。

产于中亚、西亚、地中海地区至欧洲,我国北部地区有栽培。

花芳香,可提芳香油;又为庭园观赏树种。

由于 P.S. Green (in Kew Mag. 6(5):117. 1989) 发现 Miller (1768) 当时发表 *S. laciniata* 新种的材料,其花粉粒 90% 不孕,从而才搞清楚了原产我国甘肃一带具裂叶的丁香与 Miller 的 *S. laciniata* 是完全不同的两个分类群,前者花粉粒可孕,并认为 Miller 的 *S. laciniata* 是个杂交种,可能由 *S. protolaciniata* × *S. vulgaris* 杂交产生的。而 *S.* × *persica* 则可能由 *S.* × *laciniata* 和 *S. vulgaris* 回交产生。

15b. 白花花叶丁香(变型)(中国树木分类学)

f. *alba* (Weston) Voss, Vilmor. Blumengärt. 1:654. 1895; Rehd. Bibl. Cult. Trees & Shrubs 568. 1949. — *S. persica* var. *alba* Weston, Bot. Univ. 1:289. 1770, “2”; McKelvey, Lilac 463. 1928; 陈嵘,中国树木分类学 1056. 1937; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 6, 782. 1954, excl. syn. *S. steencruyssii* Hort. — *S. persica* var. a. *typica* f. *alba* Lingelsh. in Engl. Pflanzenr. 72(IV-243):91. 1920, excl. syn. *S. steencruyssii* Hort