

根据文献,本变种产于台湾,与原变种区别在于其叶片较大,长4.5—6.5厘米,宽1.5—2.8厘米,全缘;花较大,花冠管长1.5—2毫米,裂片长约5毫米;苞片被更密的柔毛。

根据记载,其花、叶的变异仍属原变种变异范围之内,而原变种的某些标本,如 *Migð s. n.*, 其叶片有全缘的,也有具1—3对锯齿的,苞片上的柔毛有疏有密,变异较大。但由于未看到标本,暂且仍保留本变种。

11. 齿叶木犀(中国树木分类学) 图版 27:3

Osmanthus × *fortunei* Carr. in Rev. Hort. 1864:69. f. 7, 8. 1864; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 2:791. 1911; Nakai & Koidz. Trees & Shrubs Jap. Proper ed. 2, 1:355, f. 165. 1927; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs 758. 1927; Nakai in Bot. Mag. Tokyo 44:15. 1930; 陈嵘, 中国树木分类学 1021. 1937; Bailey & Bailey. Hortus Second 523. 1941; Bean, Trees & Shrubs Brit. Isl. ed. 7, 2:380. 1951; P. S. Green in Not. Bot. Gard. Edinb. 22(5):505. 1958. — *Olea japonicus* Sieb. in Verh. Bot. Gen. 12: 36. 1830, nom. nud.; Makino in Bot. Mag. Tokyo 16:31. 1902. — *O. japonica* Sieb. ex Hassk. Cat. Hort. Bogor. 118. 1844, nom. nud. — *Osmanthus aquifolium* var. *japonicus* (Sieb. ex Makino) Makino in Bot. Mag. Tokyo 23:14. 1909. — *Olea aquifolia* auct. non Sieb. & Zucc. 1846; Dipp. Handb. Laubh. 1:140. 1889, p. p. quoad f. 88.

常绿灌木或乔木,高约2米,最高可达7米;树皮灰色。小枝灰白色,幼枝灰黄色,被柔毛。叶片厚革质,宽椭圆形,稀椭圆形或卵形,长6—8厘米,宽3—4(—5)厘米,先端渐尖,呈短尾状,具针尖头,基部宽楔形或稍呈圆形,叶缘具8—9对大而锐尖的锯齿,齿长2—4毫米,两面具针尖状突起的小腺点,中脉在上面凹入,被柔毛,近叶柄处尤密,下面凸起,侧脉7—9对在两面均凸起,上面尤为明显;叶柄长(5—)7—10毫米,多少被柔毛。花序簇生于叶腋,每腋内有花6—12朵;苞片长2—3毫米,具短尖头,被柔毛;花梗长5—10毫米,无毛;花芳香;花萼长约1毫米,具大小不等裂片;花冠白色,花冠管短,仅长1.5—2毫米,裂片长4—5毫米;雄蕊着生于花冠管上部,长2.5—3毫米,花药与花丝几等长,药隔延伸成一明显的小尖头;雄花中具不育的雌蕊,呈圆锥状,长约1毫米。果未见。

本种为 *O. fragrans* Lour. 与 *O. heterophyllus* (G. Don) P. S. Green 的杂交种,仅分布于我国台湾。目前仅知其为栽培植物。日本也有。

12. 蒙自桂花(云南种子植物名录) 图版 28:1

Osmanthus henryi P. S. Green in Not. Bot. Gard. Edinb. 22(5):499. 1958; 云南植物志 4: 625. 1986.

常绿小乔木或灌木,高3—4米,最高可达8米。枝灰白色,小枝黄白色,有皮孔,被柔毛,老时无毛。叶片厚革质,椭圆形至倒披针形,长(7—)8—9(—11)厘米,宽(2.5—)3—4.5厘米,先端渐尖或尾状,基部狭楔形,全缘或具牙齿状锯齿,每边约有20对,齿长约1毫米,腺点在两面均呈小水泡状突起,中脉在上面略凹入,被柔毛,近叶柄处柔毛尤密,在



1—2. 栲树 *Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P. S. Green var. *heterophyllus*, 1. 花枝; 2. 雄花花冠。3. 齿叶木犀 *O. × fortunei* Carr., 小枝。(陆锦文绘)