

1—2 毫米,先端锐尖,被长硬毛,边缘具睫毛;花萼长约 0.8 毫米,裂片大小不等;花冠管长约 1.5 毫米,裂片半圆形,长约 1.3 毫米;雄蕊着生于花冠管中部,花丝长约 0.5 毫米,花药长约 1.4 毫米,药隔在花药先端延伸成一小而圆形的突起;雄花中不育雌蕊多少呈圆锥形,长约 1 毫米。果未见。

产于我国台湾。琉球群岛也有分布。模式标本采自台湾。

未见标本。本种描述根据台湾植物志。

17. 细脉木犀(植物分类学报) 图版 25: 3—4

Osmanthus gracilinervis Chia ex R. L. Lu in Acta Phytotax. Sin. 27(1):71. 1989. — *Osmanthus* sp. “D” P. S. Green in Not. Bot. Gard. Edinb. 22(5): 525. 1958.

常绿小乔木或灌木,高 2—5 米。枝灰褐色,幼枝淡黄白色,无毛,有少数皮孔。叶片革质,椭圆形或狭椭圆形、稀狭卵形,长 5—9 厘米,宽 2—3(—3.5) 厘米,先端长渐尖,呈尾状,基部宽楔形或钝,全缘,腺点在两面连接成小水泡状突起,稀呈针尖状突起,中脉在上面凹入,下面明显凸起,侧脉 5—8 对,在上面极不明显,下面稍明显;叶柄长约 1 厘米,无毛。花序簇生于叶腋,每腋内有花 5—10 朵;苞片长约 1 毫米,先端具硬而长的尖端,无毛;花萼长约 1 毫米,裂片明显或不明显,呈三角状浅齿;花冠白色,长约 4 毫米,花冠管长约 2 毫米,与裂片近等长,稀略长于裂片,裂片近卵形;雄蕊着生于花冠管中部,花丝较短,长约 0.5 毫米,花药长约 1.5 毫米,药隔在花药先端延伸成明显小尖头;雄花中不育雌蕊长约 1.5 毫米。果椭圆形,长约 1.5 厘米,呈绿黑色。花期 9—10 月,果期翌年 4—5 月。

产于浙江、江西、湖南、广东、广西等地。生海拔 300—1 200 米的山坡混交林和山谷密林中。模式标本采自广西平南。

本种与狭叶木犀 *O. attenuatus* P. S. Green 和宁波木犀 *O. cooperi* Hemsl. 相似,与前者区别在于本种的小枝、叶柄、中脉和苞片均无毛;与后者区别在于叶片为狭椭圆形或椭圆形,两面腺点呈小水泡状突起,苞片无毛,花冠裂片绝不长于花冠管。

18. 锐叶木犀(台湾植物志)

Osmanthus lanceolatus Hayata in Journ. Coll. Sci. Tokyo 30:192. 1911. et lc. Pl. Formos. 5:125, f. 44, d—g. 1915; Kanehira, Formos. Trees 368. 1917, ed. 2, 621, f. 578. 1936; Moir in Journ. Jap. Bot. 15:554. 1939; P. S. Green in Not. Bot. Gard. Edinb. 22(5): 522. 1958; 台湾植物志 4: 148. 1978. — *Osmanthus* sp. Hayata in Journ. Coll. Sci. Tokyo. 25: 161. 1908 — *O. daibuensis* Hayata, lc. Pl. Formos. 9:72, f. 28. 1920. — *O. gamostromus* Hayata, l. c. 9:74, f. 29. 1920.

常绿灌木或小乔木,高 5—12 米;树皮暗褐色。小枝灰白色或灰黄色,无毛,稀幼时被柔毛。叶片革质,披针形,长 7—10 厘米,宽 2—3 厘米,先端长渐尖,具锐尖头,基部楔形,多少有些歪斜,全缘,或有时有锯齿,腺点在两面呈细点状突起,中脉在上面微凹入,下面



1—2. 宁波木犀 *Osmanthus cooperi* Hemsl., 1. 花枝; 2. 花冠展开。3—4. 细脉木犀 *O. gracilinervis* Chia ex R.L. Lu, 3. 花枝; 4. 花冠展开。(陆锦文绘)