

凸起,侧脉 7—9 对,在两面稍凸起,与小脉连接略呈网状;叶柄长 5—10 毫米,无毛,稀幼时被毛。花序簇生于叶腋,每腋内有花 7—12 朵;苞片长 1.5—3 毫米,无毛;花梗长 2—10 毫米,无毛;花芳香;花萼长约 1 毫米,具大小不等的裂片;花冠白色,花冠管长 1.2—1.5 毫米,裂片长 2.5—3.5 毫米;雄蕊着生花冠管上部,花丝长 0.5—1 毫米,花药长椭圆形,长 1.2—1.5 毫米,基部呈深心形,药隔延伸呈紫褐色小尖头;不育子房卵形,柱头头状,浅 2 裂。果椭圆形,长约 9 毫米,径约 5 毫米,呈淡黑色。

产于我国台湾。生海拔 2 000—3 500 米的山地。模式标本采自台湾玉山。

19. 网脉木犀 图版 29:1—3

Osmanthus reticulatus P. S. Green in Not. Bot. Gard. Edinb. 22(5): 517. 1958.

常绿灌木或小乔木,高 3—8 米,最高可达 12 米。枝灰白色,小枝黄白色,具较多皮孔。叶片革质,椭圆形或狭卵形,长 6—9 厘米,宽 2—3.5 厘米,先端渐尖,略呈尾状,基部圆形或宽楔形,全缘或约有 15 对锯齿,多达 30 对,齿端具锐尖头,腺点在两面均极明显,中脉在上面凹入,下面凸起,幼时上面被柔毛,侧脉 6—9 对,稀可达 12 对,与小脉连成网状,在两面均明显凸起;叶柄长 0.5—1.5(—2) 厘米,无毛。花序簇生于叶腋;苞片无毛,或被少数柔毛,长 2—3 毫米;花梗长 3—5 毫米,稀可达 7—8 毫米,无毛;花萼长约 1 毫米,具不等的短裂片;花冠白色,长 3.5—4 毫米,花冠管长约 2 毫米,裂片长 1.5—2 毫米;雄蕊着生在花冠管中部,花丝长约 1 毫米,花药长 1—1.5 毫米,药隔明显延伸成一小尖头;雌蕊长约 2 毫米,子房圆锥形,花柱长约 0.8 毫米,柱头头状,2 裂,极浅。果长约 1 厘米,呈紫黑色。

花期 10—11 月,果期 5—6 月。

产于湖南、广东、广西、贵州、四川等地。生海拔 1 100—2 100 米的山地密林、山谷疏林、及溪岸边。模式标本采自贵州梵净山。

20. 显脉木犀(海南植物志)

Osmanthus hainanensis P. S. Green in Not. Bot. Gard. Edinb. 22(5): 504. 1958. 海南植物志 3: 210. 1974.

常绿灌木或小乔木,高 5—6 米;树皮灰黑色。小枝灰褐色,幼枝无毛。叶片厚革质,椭圆形,长圆形至倒披针形,长 7—12.5 厘米,宽 2.5—4.5 厘米,先端渐尖,略呈尾状,具钝头,基部楔形,全缘,腺点在两面均呈小针尖状突起,中脉在上面平坦或稍凸起,侧脉 9—12 对,在两面凸起,与小脉连成不明显网状;叶柄长 1.5—2 厘米,无毛。花序簇生于叶腋,每腋内有花 4—5 朵;花梗长 5—7 毫米,无毛;苞片长 2—3.5 毫米,无毛;花芳香;花萼长约 1 毫米,具浅而不整齐的裂片,与萼管近等长;花冠白色,长约 5 毫米,花冠管长 2—2.5 毫米,裂片长 2.5—3 毫米;雄蕊着生于花冠管下半部,花丝长约 0.8 毫米,花药长约 2 毫米,药隔稍延伸成一小尖头;退化雌蕊长 2—3 毫米。果椭圆形或卵状椭圆形,长 1.5 厘米,宽 0.8 厘米,两端钝,呈绿色。花期 10—11 月,果期翌年 5 月。



1--3. 网脉木犀 *Osmanthus reticulatus* P. S. Green, 1. 花枝; 2. 花; 3. 花冠展开。4—6. 木犀 *O. fragrans* (Thunb.) Lour., 4. 花枝; 5. 花冠展开; 6. 果枝。7. 石山桂花 *O. fordii* Hemsl., 小枝。(陆锦文绘)