

稍压扁,节间长3—6厘米。叶片纸质,长圆状椭圆形或椭圆形,长3.5—13(—20)厘米,宽1.5—5.5厘米,先端短尾状,钝头,基部楔形或近钝,有时圆形,叶缘稍反卷,两面无毛,上面橄榄绿色,下面色较淡,被细小黑点,中脉在上面凹入,下面凸起,侧脉6—10对,纤细,两面微凸起,细脉在上面明显,与侧脉结成网状;叶柄短,长1—2毫米,具沟,无毛。圆锥花序极短,长1—1.5厘米,生于枝顶,具皮屑状透明毛;花序梗无或极短;苞片卵形或倒卵形,长0.5—2毫米;花梗长1.2—3毫米;花萼近膜质,4深裂或裂至1/2处,裂片长1—1.5毫米,先端锐尖或渐尖,密被皮屑状透明毛;花冠白色,长5—7毫米,裂片狭长椭圆形或线形,基部成对合生,长4.5—6毫米,宽1毫米;花丝极短,花药椭圆形,长约1毫米。果卵状长椭圆形,长约1.1厘米,宽约7毫米。花期1—3月,果期翌年1月。

产于海南。生低海拔的山顶杂林中或山谷林中。模式标本采自海南陵水。

2. 长花李榄(植物分类学报) 长花插柚紫(云南植物志), 长花流苏树(考察与研究)

Linociera longiflora Li in Journ. Arn. Arb. 25: 313. 1944; Chia in Acta Phytotax. Sin. 3: 350, pl. 46, 11-a. b. 1954; 云南植物志 4: 627. 1986. ——*Chionanthus longiflorus*(Li) Miao in Investigat. Stud. Nat. 7: 18. 1987.

乔木,高约10米。枝灰褐色或褐色,圆柱形,幼枝褐黄色,近圆柱形或稍压扁,无毛或近无毛。叶片纸质,卵状椭圆形或椭圆形,长8—15厘米,宽3—6.5厘米,先端渐尖或长渐尖,稀稍钝,基部渐窄,无毛,叶缘稍反卷,两面疏被细小的白色圆形小鳞片,上面有时沿中脉具瘤点状凸起,中脉在上面平,下面凸起,侧脉8—9对,在两面凸起,细脉在上面明显,与侧脉结成网状;叶柄长2—3.5厘米,基部具沟,无毛。圆锥花序腋生,多花,长4—9厘米,无毛;花序梗长1.5—4厘米;苞片和小苞片披针形或卵形,长1—4毫米;花梗长1—2毫米;花长5—8毫米,花萼长1—1.5毫米,裂片卵形,长0.6—1毫米,先端锐尖或稍钝;花冠管长0.4—0.6毫米,裂片披针形,长4—7毫米,宽1—1.5毫米,基部稍合生,先端钝,盔状,边缘内折;花丝极短,花药椭圆形或长椭圆形,长1.5—2毫米;子房卵形,无毛,花柱短,柱头头状。果未见。花期3月。

产于云南。生山坡林中,海拔约1700米。模式标本采自云南龙陵。

3. 海南李榄(植物分类学报) 海南流苏树(考察与研究) 图版 31: 1—2

Linociera hainanensis Merr. & Chun in Sunyatsenia 5: 169, pl. 25. 1940; Chia in Acta Phytotax. Sin. 3: 350, pl. 47, 12-a. b. 1954; 海南植物志 3: 216. 1974. ——*L. ramiflora* (Roxb.) Wall. ex G. Don f. *caudatifolia* Chia in Acta Phytotax. Sin. 3: 352. 1955; 海南植物志 3: 217. 1974. ——*Chionanthus hainanensis* (Merr. & Chun) Miao in Investigat. Stud. Nat. 7: 18. 1987.

灌木或乔木,高3—12米,树皮灰色。枝淡褐色或褐色,圆柱形,密被圆形突起的皮孔,幼枝稍压扁,苍白色或淡褐色,无毛,粗糙。叶片薄革质,倒卵形、倒卵状披针形至披针形,有时椭圆形,长5—11厘米,宽1.5—4厘米,先端钝、钝渐尖至短尾尖,基部渐窄,叶缘